

Université de Rennes 1

Master 2 – Année 2010/2011

Systèmes dynamiques et théorie ergodique

Examen terminal du 14 /12/2010

durée 1h30 –notes de cours autorisées

1 - [2P.] Soient (X, \mathcal{A}, μ, T) et (Y, \mathcal{B}, ν, S) deux systèmes dynamiques préservant une mesure de probabilité. On suppose que ces deux systèmes sont isomorphes. Montrer que les entropies $h(T)$ et $h(S)$ de T et S sont égales.

2 - [4P.] Soit (X, \mathcal{B}, μ, T) un système dynamique préservant une mesure de probabilité. Soit $A \in \mathcal{B}$ avec $\mu(A) > 0$. Soit $(A, \mathcal{A}, \mu_A, T_A)$ le système induit. On rappelle que $T_A : A \rightarrow A$ est définie par $T_A x = T^{n_A(x)}(x)$, où $n_A(x) = \min\{n \geq 1 \mid T^n x \in A\}$. On suppose que T est ergodique. On rappelle que ceci implique que T_A est ergodique.

(i) Montrer que, pour presque tout $x \in A$, on a

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} n_A(T_A^k x) = \frac{1}{\mu(A)} \int_A n_A d\mu.$$

(ii) Soit $N \in \mathbf{N}$; on définit $\tau_N(x) = \sum_{k=0}^{N-1} n_A(T_A^k x)$ pour tout $x \in A$. Montrer que $\sum_{k=0}^{\tau_N(x)-1} \mathbf{1}_A(T^k x) = N$ pour tout $x \in A$.

(iii) Montrer que, pour presque tout $x \in A$, on a

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{\tau_N(x)} = \int_A \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

(iv) En déduire la “formule de Kac”

$$\frac{1}{\mu(A)} \int_A n_A d\mu = \frac{1}{\mu(A)}.$$

3 -[14P.] On considère l’application “tente” $S : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ définie par $Sx = 2x$ pour $x \in [0, 1/2]$ et $Sx = 2 - 2x$ pour $x \in [1/2, 1]$. Soit λ la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$.

(i) Vérifier que λ est S -invariante.

(ii) Soit $E_2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1], x \mapsto \{2x\}$. Montrer que le système $([0, 1], E_2, \lambda)$ est fortement mélangeant.

- (iii) Montrer que $S^{n+1} = S \circ E_2^n$ pour tout $n \geq 1$.
- (iv) Montrer que le système $([0, 1], S, \lambda)$ est fortement mélangeant.

On considère maintenant l'application "logistique"

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto 4x(1 - x).$$

- (v) Vérifier que, pour tout $\theta \in \mathbf{R}$ et tout $n \in \mathbf{N}^*$, on a $T^n(\sin^2 \theta) = \sin^2(2^n \theta)$.
- (vi) Pour tout $n \geq 1$, déterminer les points $x \in [0, 1]$ de période n sous T . En déduire que les points périodiques de T sont denses dans $[0, 1]$.
- (vii) On considère la bijection de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ définie par $\varphi(x) = \sin^2(\pi x/2)$. Vérifier que $T \circ \varphi = \varphi \circ S$.

Soit μ la mesure de probabilité définie sur les boréliens de $[0, 1]$ par

$$\mu(A) = \frac{1}{\pi} \int_A \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$$

- (viii) Montrer que μ est T -invariante.
- (ix) Montrer que le système $([0, 1], T, \mu)$ est ergodique.
- (x) Soit $\alpha \in [0, 1]$. Montrer que, pour λ -presque tout $x \in [0, 1]$ on a

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \text{Card}\{n : 1 \leq n \leq N, T^n x \leq \alpha\} = \frac{2}{\pi} \text{Arcsin}(\sqrt{\alpha}).$$

- (xi) Montrer que l'entropie de T est $h(T) = \log 2$.
(*Indication:* On pourra utiliser, sans le prouver, le fait que $\{[0, 1/2], [1/2, 1]\}$ est une partition génératrice.)