

## MATRICES

Les matrices sont des tableaux de nombres. La résolution d'un certain nombre de problèmes d'algèbre linéaire se ramène à des manipulations sur les matrices. Ceci est vrai en particulier pour la résolution des systèmes linéaires.

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne un corps. On peut penser à  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1. DÉFINITION

#### 1.1. Définition.

##### Définition 1.

- Une **matrice**  $A$  est un tableau rectangulaire d'éléments de  $\mathbb{K}$ .
- Elle est dite de **taille**  $n \times p$  si le tableau possède  $n$  lignes et  $p$  colonnes.
- Les nombres du tableau sont appelés les **coefficients** de  $A$ .
- Le coefficient situé à la  $i$ -ème ligne et à la  $j$ -ème colonne est noté  $a_{i,j}$ .

Un tel tableau est représenté de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \quad \text{ou} \quad (a_{i,j}).$$

##### Exemple 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

est une matrice  $2 \times 3$  avec, par exemple,  $a_{1,1} = 1$  et  $a_{2,3} = 7$ .

Encore quelques définitions :

##### Définition 2.

- Deux matrices sont **égales** lorsqu'elles ont la même taille et que les coefficients correspondants sont égaux.
- L'ensemble des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est noté  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ . Les éléments de  $M_{n,p}(\mathbb{R})$  sont appelés **matrices réelles**.

#### 1.2. Matrices particulières. Voici quelques types de matrices intéressantes :

- Si  $n = p$  (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite **matrice carrée**. On note  $M_n(\mathbb{K})$  au lieu de  $M_{n,n}(\mathbb{K})$ .

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Les éléments  $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$  forment la **diagonale principale** de la matrice.

— Une matrice qui n'a qu'une seule ligne ( $n = 1$ ) est appelée **matrice ligne** ou **vecteur ligne**. On la note

$$A = (a_{1,1} \quad a_{1,2} \quad \dots \quad a_{1,p}).$$

— De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne ( $p = 1$ ) est appelée **matrice colonne** ou **vecteur colonne**. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix}.$$

— La matrice (de taille  $n \times p$ ) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la **matrice nulle** et est notée  $0_{n,p}$  ou plus simplement  $0$ . Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre  $0$  pour les réels.

### 1.3. Addition de matrices.

**Définition 3** (Somme de deux matrices). Soient  $A$  et  $B$  deux matrices ayant la même taille  $n \times p$ . Leur **somme**  $C = A + B$  est la matrice de taille  $n \times p$  définie par

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

En d'autres termes, on somme coefficients par coefficients. Remarque : on note indifféremment  $a_{ij}$  où  $a_{i,j}$  pour les coefficients de la matrice  $A$ .

**Exemple 2.**

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Par contre si } B' = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad A + B' \quad \text{n'est pas définie.}$$

**Définition 4** (Produit d'une matrice par un scalaire). Le produit d'une matrice  $A = (a_{ij})$  de  $M_{n,p}(\mathbb{K})$  par un scalaire  $\alpha \in \mathbb{K}$  est la matrice  $(\alpha a_{ij})$  formée en multipliant chaque coefficient de  $A$  par  $\alpha$ . Elle est notée  $\alpha \cdot A$  (ou simplement  $\alpha A$ ).

**Exemple 3.**

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \alpha = 2 \quad \text{alors} \quad \alpha A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice  $(-1)A$  est l'**opposée** de  $A$  et est notée  $-A$ . La **différence**  $A - B$  est définie par  $A + (-B)$ .

**Exemple 4.**

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad A - B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

L'addition et la multiplication par un scalaire se comportent sans surprises :

**Proposition 1.** Soient  $A, B$  et  $C$  trois matrices appartenant à  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ . Soient  $\alpha \in \mathbb{K}$  et  $\beta \in \mathbb{K}$  deux scalaires.

- (1)  $A + B = B + A$  : la somme est commutative,
- (2)  $A + (B + C) = (A + B) + C$  : la somme est associative,
- (3)  $A + 0 = A$  : la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition,

(4)  $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A,$

(5)  $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B.$

*Démonstration.* Prouvons par exemple le quatrième point. Le terme général de  $(\alpha + \beta)A$  est égal à  $(\alpha + \beta)a_{ij}$ . D'après les règles de calcul dans  $\mathbb{K}$ ,  $(\alpha + \beta)a_{ij}$  est égal à  $\alpha a_{ij} + \beta a_{ij}$  qui est le terme général de la matrice  $\alpha A + \beta A$ .

□

**Mini-exercices.**

- (1) Soient  $A = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 21 & -6 \\ 0 & 3 \\ -3 & 12 \end{pmatrix}$ ,  $D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ -8 & 6 \end{pmatrix}$ . Calculer toutes les sommes possibles de deux de ces matrices.
- (2) Montrer que si  $A + B = A$ , alors  $B$  est la matrice nulle.
- (3) Que vaut  $0 \cdot A$ ? et  $1 \cdot A$ ? Justifier l'affirmation :  $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$ . Idem avec  $nA = A + A + \dots + A$  ( $n$  occurrences de  $A$ ).

2. MULTIPLICATION DE MATRICES

**2.1. Définition du produit.** Le produit  $AB$  de deux matrices  $A$  et  $B$  est défini si et seulement si le nombre de colonnes de  $A$  est égal au nombre de lignes de  $B$ .

**Définition 5** (Produit de deux matrices). Soient  $A = (a_{ij})$  une matrice  $n \times p$  et  $B = (b_{ij})$  une matrice  $p \times q$ . Alors le produit  $C = AB$  est une matrice  $n \times q$  dont les coefficients  $c_{ij}$  sont définis par :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

On peut écrire le coefficient de façon plus développée, à savoir :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ik}b_{kj} + \dots + a_{ip}b_{pj}.$$

Il est commode de disposer les calculs de la façon suivante.

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ \times & \times & \times & \times & \\ & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & \times & \\ & & & | & \\ & & & - & \\ & & & - & \\ & & & - & c_{ij} \end{pmatrix} \leftarrow B$$

$$\leftarrow AB$$

Avec cette disposition, on considère d'abord la ligne de la matrice  $A$  située à gauche du coefficient que l'on veut calculer (ligne représentée par des  $\times$  dans  $A$ ) et aussi la colonne de la matrice  $B$  située au-dessus du coefficient que l'on veut calculer (colonne représentée par des  $\times$  dans  $B$ ). On calcule le produit du premier coefficient de la ligne par le premier coefficient de la colonne ( $a_{i1} \times b_{1j}$ ), que l'on ajoute au produit du deuxième coefficient de la ligne par le deuxième coefficient de la colonne ( $a_{i2} \times b_{2j}$ ), que l'on ajoute au produit du troisième. . .

## 2.2. Exemples.

### Exemple 5.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On dispose d'abord le produit correctement (à gauche) : la matrice obtenue est de taille  $2 \times 2$ . Puis on calcule chacun des coefficients, en commençant par le premier coefficient  $c_{11} = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 1 = 2$  (au milieu), puis les autres (à droite).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$$

Un exemple intéressant est le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne :

$$u = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n) \quad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Alors  $u \times v$  est une matrice de taille  $1 \times 1$  dont l'unique coefficient est  $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$ . Ce nombre s'appelle le **produit scalaire** des vecteurs  $u$  et  $v$ .

Calculer le coefficient  $c_{ij}$  dans le produit  $A \times B$  revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la  $i$ -ème ligne de  $A$  et la  $j$ -ème colonne de  $B$ .

## 2.3. Pièges à éviter. Premier piège. Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.

En effet, il se peut que  $AB$  soit défini mais pas  $BA$ , ou que  $AB$  et  $BA$  soient tous deux définis mais pas de la même taille. Mais même dans le cas où  $AB$  et  $BA$  sont définis et de la même taille, on a en général  $AB \neq BA$ .

### Exemple 6.

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{mais} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{pmatrix}.$$

**Deuxième piège.**  $AB = 0$  n'implique pas  $A = 0$  ou  $B = 0$ .

Il peut arriver que le produit de deux matrices non nulles soit nul. En d'autres termes, on peut avoir  $A \neq 0$  et  $B \neq 0$  mais  $AB = 0$ .

### Exemple 7.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Troisième piège.**  $AB = AC$  n'implique pas  $B = C$ . On peut avoir  $AB = AC$  et  $B \neq C$ .

### Exemple 8.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad AB = AC = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix}.$$

**2.4. Propriétés du produit de matrices.** Malgré les difficultés soulevées au-dessus, le produit vérifie les propriétés suivantes :

**Proposition 2.**

- (1) Soient  $A$  dans  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $B$  dans  $M_{p,q}(\mathbb{K})$  et  $C$  dans  $M_{q,r}(\mathbb{K})$ . Alors  $A(BC) = (AB)C$  : associativité du produit,
- (2) Soient  $A$  dans  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $B$  et  $C$  dans  $M_{p,q}(\mathbb{K})$ . Alors  $A(B+C) = AB+AC$  et  $(B+C)A = BA+CA$  : distributivité du produit par rapport à la somme,
- (3) Soit  $A$  dans  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ . Alors pour tout entier  $q$  on a  $A \cdot 0_{p,q} = 0_{n,q}$  et  $0_{q,n} \cdot A = 0_{q,p}$ .

*Démonstration.* Posons  $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $B = (b_{ij}) \in M_{p,q}(\mathbb{K})$  et  $C = (c_{ij}) \in M_{q,r}(\mathbb{K})$ . Prouvons que  $A(BC) = (AB)C$  en montrant que les matrices  $A(BC)$  et  $(AB)C$  ont les mêmes coefficients.

Le terme d'indice  $(i, k)$  de la matrice  $AB$  est  $x_{ik} = \sum_{\ell=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k}$ . Le terme d'indice  $(i, j)$  de la matrice  $(AB)C$  est donc

$$\sum_{k=1}^q x_{ik} c_{kj} = \sum_{k=1}^q \left( \sum_{\ell=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k} \right) c_{kj}.$$

Le terme d'indice  $(\ell, j)$  de la matrice  $BC$  est  $y_{\ell j} = \sum_{k=1}^q b_{\ell k} c_{kj}$ . Le terme d'indice  $(i, j)$  de la matrice  $A(BC)$  est donc

$$\sum_{\ell=1}^p a_{i\ell} \left( \sum_{k=1}^q b_{\ell k} c_{kj} \right).$$

Comme dans  $\mathbb{K}$  la multiplication est distributive et associative, les coefficients de  $(AB)C$  et  $A(BC)$  coïncident. Les autres démonstrations se font comme celle de l'associativité. □

**2.5. La matrice identité.** La matrice carrée suivante s'appelle la **matrice identité** :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous ses autres éléments sont égaux à 0. Elle se note  $I_n$  ou simplement  $I$ .

**Remarque.** La matrice unité d'ordre  $n$  est telle que tous les éléments de la diagonale principale sont égaux à 1, les autres étant tous nuls.

On peut formaliser cela en introduisant le symbole de Kronecker. Si  $i$  et  $j$  sont deux entiers, on appelle **symbole de Kronecker**, et on note  $\delta_{i,j}$ , le réel qui vaut 0 si  $i$  est différent de  $j$ , et 1 si  $i$  est égal à  $j$ . Donc

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Alors le terme général de la matrice identité  $I_n$  est  $\delta_{i,j}$  avec  $i$  et  $j$  entiers, compris entre 1 et  $n$ .

Dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. C'est l'élément neutre pour la multiplication. En d'autres termes :

**Proposition 3.** Si  $A$  est une matrice  $n \times p$ , alors

$$I_n \cdot A = A \quad \text{et} \quad A \cdot I_p = A.$$

*Démonstration.* Soit  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$  de terme général  $a_{ij}$ .

La matrice produit  $AI_p$  est une matrice appartenant à  $M_{n,p}(\mathbb{K})$  dont le terme général  $c_{ij}$  est donné par la formule  $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}\delta_{kj}$ . Dans cette somme,  $i$  et  $j$  sont fixés et  $k$  prend toutes les valeurs comprises entre 1 et  $p$ . Si  $k \neq j$  alors  $\delta_{kj} = 0$ , et si  $k = j$  alors  $\delta_{kj} = 1$ . Donc dans la somme qui définit  $c_{ij}$ , tous les termes correspondant à des valeurs de  $k$  différentes de  $j$  sont nuls et il reste donc  $c_{ij} = a_{ij}\delta_{jj} = a_{ij}1 = a_{ij}$ . Donc les matrices  $AI_p$  et  $A$  ont le même terme général et sont donc égales. L'égalité  $I_n A = A$  se démontre de la même façon. □

**2.6. Puissance d'une matrice carrée.** Dans l'ensemble  $M_n(\mathbb{K})$  des matrices carrées de taille  $n \times n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ , la multiplication des matrices est une opération interne : si  $A, B \in M_n(\mathbb{K})$  alors  $AB \in M_n(\mathbb{K})$ .

En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même : on note  $A^2 = A \times A$ ,  $A^3 = A \times A \times A$ .

On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice :

**Définition 6.** Pour tout  $A \in M_n(\mathbb{K})$ , on définit les puissances successives de  $A$  par  $A^0 = I_n$  et  $A^{p+1} = A^p \times A$  pour tout  $p \in \mathbb{N}$ . Autrement dit,  $A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ facteurs}}$ .

**Exemple 9.** On cherche à calculer  $A^p$  avec  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . On calcule  $A^2$ ,  $A^3$  et  $A^4$  et on obtient :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad A^4 = A^3 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}.$$

L'observation de ces premières puissances permet de penser que la formule est :  $A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}$ .

Démontrons ce résultat par récurrence.

Pour cela, définissons notre hypothèse de récurrence  $H_p$  à l'ordre  $p \in \mathbb{N}^*$  comme étant

$$H_p : \quad A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}.$$

Initialisation : le résultat est vrai pour  $p = 1$  (on retrouve  $A$ ).

Hérédité : on suppose  $H_p$  pour un entier  $p \in \mathbb{N}^*$  et on démontre  $H_{p+1}$ . Or, d'après la définition,

$$A^{p+1} = A^p \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{p+1} - 1 \\ 0 & (-1)^{p+1} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{p+1} \end{pmatrix},$$

d'où  $H_{p+1}$ . Donc la propriété est démontrée par récurrence.

**2.7. Formule du binôme.** Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses. En particulier,  $(A + B)^2$  ne vaut en général pas  $A^2 + 2AB + B^2$ , mais on sait seulement que

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2.$$

**Proposition 4** (Calcul de  $(A + B)^p$  lorsque  $AB = BA$ ). Soient  $A$  et  $B$  deux éléments de  $M_n(\mathbb{K})$  qui **commutent**, c'est-à-dire tels que  $AB = BA$ . Alors, pour tout entier  $p \geq 0$ , on a la formule

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k$$

où  $\binom{p}{k}$  désigne le coefficient du binôme.

La démonstration est similaire à celle de la formule du binôme pour  $(a + b)^p$ , avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Exemple 10.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  que l'on décompose en  $A = I + N$  avec  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Notons que  $N^2 = 0$ . De plus  $I$  et  $N$  commutent, donc pour  $p \in \mathbb{N}$  on obtient

$$A^p = (I + N)^p = I^p + pI^{p-1}N$$

par la formule du binôme. On en déduit  $A^p = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Exemple 11.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . On pose  $N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ . La matrice  $N$  est

nilpotente (c'est-à-dire il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $N^k = 0$ ) comme le montrent les calculs suivants :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N^4 = 0.$$

Comme on a  $A = I + N$  et les matrices  $N$  et  $I$  commutent (la matrice identité commute avec toutes les matrices), on peut appliquer la formule du binôme de Newton. On utilise que  $I^k = I$  pour tout  $k$  et surtout que  $N^k = 0$  si  $k \geq 4$ . On obtient

$$A^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} N^k I^{p-k} = \sum_{k=0}^3 \binom{p}{k} N^k = I + pN + \frac{p(p-1)}{2!} N^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} N^3.$$

D'où

$$A^p = \begin{pmatrix} 1 & p & p^2 & p(p^2 - p + 1) \\ 0 & 1 & 2p & p(3p - 2) \\ 0 & 0 & 1 & 3p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Mini-exercices.**

- (1) Soient  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $D = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $E = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}$ . Quels produits sont possibles ? Les calculer !
- (2) Soient  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ . Calculer  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $AB$  et  $BA$ .
- (3) Soient  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Calculer  $A^p$  et  $B^p$  pour tout  $p \geq 0$ . Montrer que  $AB = BA$ . Calculer  $(A + B)^p$ .

## 3. INVERSE D'UNE MATRICE

Dans  $\mathbb{N}$ , un entier non nul n'admet pas d'inverse pour l'addition. Dans  $\mathbb{Z}$ , oui. Dans  $\mathbb{Z}$ , un entier différent de 1 n'admet pas d'inverse pour la multiplication. Dans  $\mathbb{Q}$ , oui.

Pour les matrices, la situation est plus délicate. Une matrice n'admet pas en général d'inverse pour la multiplication, même en considérant les matrices dans un ensemble plus grand.

## 3.1. Définition.

**Définition 7** (Matrice inverse). Soit  $A$  une matrice carrée de taille  $n \times n$ . S'il existe une matrice carrée  $B$  de taille  $n \times n$  telle que

$$AB = I \quad \text{et} \quad BA = I,$$

on dit que  $A$  est *inversible*. On appelle  $B$  l'*inverse de  $A$*  et on la note  $A^{-1}$ .

On verra plus tard qu'il suffit en fait de vérifier une seule des conditions  $AB = I$  ou bien  $BA = I$ .

— Plus généralement, quand  $A$  est inversible, pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , on note :

$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \dots A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}.$$

— L'ensemble des matrices inversibles de  $M_n(\mathbb{K})$  est noté  $GL_n(\mathbb{K})$  (appelé groupe linéaire d'ordre  $n$ ).

## 3.2. Exemples.

**Exemple 12.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Étudier si  $A$  est inversible, c'est étudier l'existence d'une matrice  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ , telle que  $AB = I$  et  $BA = I$ . Or  $AB = I$  équivaut à :

$$AB = I \iff \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3c & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette égalité équivaut au système :

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases}$$

Sa résolution est immédiate :  $a = 1$ ,  $b = -\frac{2}{3}$ ,  $c = 0$ ,  $d = \frac{1}{3}$ . Il n'y a donc qu'une seule matrice possible, à savoir  $B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ . Pour prouver qu'elle convient, il faut aussi montrer l'égalité  $BA = I$ ,

dont la vérification est laissée au lecteur. La matrice  $A$  est donc inversible et  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ .

**Exemple 13.** La matrice  $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$  n'est pas inversible. En effet, soit  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  une matrice quelconque. Alors le produit

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a + 5b & 0 \\ 3c + 5d & 0 \end{pmatrix}$$

ne peut jamais être égal à la matrice identité.

**Exemple 14.**

— Soit  $I_n$  la matrice carrée identité de taille  $n \times n$ . C'est une matrice inversible, et son inverse est elle-même par l'égalité  $I_n I_n = I_n$ .

— La matrice nulle  $0_n$  de taille  $n \times n$  n'est pas inversible. En effet on sait que, pour toute matrice  $B$  de  $M_n(\mathbb{K})$ , on a  $B0_n = 0_n$ , qui ne peut jamais être la matrice identité.

### 3.3. Propriétés.

#### 3.3.1. Unicité.

**Proposition 5.** Si  $A$  est inversible, alors son inverse est unique.

*Démonstration.* On va supposer l'existence de deux matrices  $B_1$  et  $B_2$  satisfaisant aux conditions imposées et démontrer que  $B_1 = B_2$ .

Soient donc  $B_1$  telle que  $AB_1 = B_1A = I_n$  et  $B_2$  telle que  $AB_2 = B_2A = I_n$ . Calculons  $B_2(AB_1)$ . D'une part, comme  $AB_1 = I_n$ , on a  $B_2(AB_1) = B_2$ . D'autre part, comme le produit des matrices est associatif, on a  $B_2(AB_1) = (B_2A)B_1 = I_nB_1 = B_1$ . Donc  $B_1 = B_2$ . □

#### 3.3.2. Inverse de l'inverse.

**Proposition 6.** Soit  $A$  une matrice inversible. Alors  $A^{-1}$  est aussi inversible et on a :

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

#### 3.3.3. Inverse d'un produit.

**Proposition 7.** Soient  $A$  et  $B$  deux matrices inversibles de même taille. Alors  $AB$  est inversible et

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Il faut bien faire attention à l'inversion de l'ordre !

*Démonstration.* Il suffit de montrer  $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$  et  $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$ . Cela suit de

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I, \\ \text{et } (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

□

De façon analogue, on montre que si  $A_1, \dots, A_m$  sont inversibles, alors

$$(A_1A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1}A_{m-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

3.3.4. *Simplification par une matrice inversible.* Si  $C$  est une matrice quelconque de  $M_n(\mathbb{K})$ , nous avons vu que la relation  $AC = BC$  où  $A$  et  $B$  sont des éléments de  $M_n(\mathbb{K})$  n'entraîne pas forcément l'égalité  $A = B$ . En revanche, si  $C$  est une matrice inversible, on a la proposition suivante :

**Proposition 8.** Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de  $M_n(\mathbb{K})$  et  $C$  une matrice inversible de  $M_n(\mathbb{K})$ . Alors l'égalité  $AC = BC$  implique l'égalité  $A = B$ .

*Démonstration.* Ce résultat est immédiat : si on multiplie à droite l'égalité  $AC = BC$  par  $C^{-1}$ , on obtient l'égalité :  $(AC)C^{-1} = (BC)C^{-1}$ . En utilisant l'associativité du produit des matrices on a  $A(CC^{-1}) = B(CC^{-1})$ , ce qui donne d'après la définition de l'inverse  $AI = BI$ , d'où  $A = B$ . □

### Mini-exercices.

(1) Soient  $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ . Calculer  $A^{-1}$ ,  $B^{-1}$ ,  $(AB)^{-1}$ ,  $(BA)^{-1}$ ,  $A^{-2}$ .

(2) Calculer l'inverse de  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

(3) Soit  $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $2A - A^2$ . Sans calculs, en déduire  $A^{-1}$ .

#### 4. INVERSE D'UNE MATRICE : CALCUL

Nous allons voir une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice quelconque de manière efficace. Cette méthode est une reformulation de la méthode du pivot de Gauss pour les systèmes linéaires. Auparavant, nous commençons par une formule directe dans le cas simple des matrices  $2 \times 2$ .

4.1. **Matrices  $2 \times 2$ .** Considérons la matrice  $2 \times 2$  :  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ .

**Proposition 9.** Si  $ad - bc \neq 0$ , alors  $A$  est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

*Démonstration.* On vérifie que si  $B = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$  alors  $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Idem pour  $BA$ .

□

4.2. **Méthode de Gauss pour inverser les matrices.** La méthode pour inverser une matrice  $A$  consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice  $A$  jusqu'à la transformer en la matrice identité  $I$ . On fait simultanément les mêmes opérations élémentaires en partant de la matrice  $I$ . On aboutit alors à une matrice qui est  $A^{-1}$ . La preuve sera vue dans la section suivante.

En pratique, on fait les deux opérations en même temps en adoptant la disposition suivante : à côté de la matrice  $A$  que l'on veut inverser, on rajoute la matrice identité pour former un tableau  $(A | I)$ . Sur les lignes de cette matrice augmentée, on effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau  $(I | B)$ . Et alors  $B = A^{-1}$ .

Ces opérations élémentaires sur les lignes sont :

- (1)  $L_i \leftarrow \lambda L_i$  avec  $\lambda \neq 0$  : on peut multiplier une ligne par un réel non nul (ou un élément de  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ ).
- (2)  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  avec  $\lambda \in \mathbb{K}$  (et  $j \neq i$ ) : on peut ajouter à la ligne  $L_i$  un multiple d'une autre ligne  $L_j$ .
- (3)  $L_i \leftrightarrow L_j$  : on peut échanger deux lignes.

N'oubliez pas : tout ce que vous faites sur la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie droite.

4.3. **Un exemple.** Calculons l'inverse de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

Voici la matrice augmentée, avec les lignes numérotées :

$$(A | I) = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

On applique la méthode de Gauss pour faire apparaître des 0 sur la première colonne, d'abord sur la deuxième ligne par l'opération élémentaire  $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$  qui conduit à la matrice augmentée :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)_{L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1}$$

Puis un 0 sur la première colonne, à la troisième ligne, avec  $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$  :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)_{L_3 \leftarrow L_3 + L_1}$$

On multiplie la ligne  $L_2$  afin qu'elle commence par 1 :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)_{L_2 \leftarrow -\frac{1}{8}L_2}$$

On continue afin de faire apparaître des 0 partout sous la diagonale, et on multiplie la ligne  $L_3$ . Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)_{L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2}$$

puis

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)_{L_3 \leftarrow 2L_3}$$

Il ne reste plus qu'à "remonter" pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)_{L_2 \leftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3}$$

puis

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)_{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 - L_3}$$

Ainsi l'inverse de  $A$  est la matrice obtenue à droite et après avoir factorisé tous les coefficients par  $\frac{1}{4}$ , on a obtenu :

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Pour éviter les erreurs de calcul, on n'oublie pas de vérifier rapidement que  $A \times A^{-1} = I$ .

### Mini-exercices.

(1) Si possible calculer l'inverse des matrices :  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} \alpha+1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$ .

(2) Calculer l'inverse des matrices :  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ .

## 5. INVERSE D'UNE MATRICE : SYSTÈMES LINÉAIRES ET MATRICES ÉLÉMENTAIRES

5.1. **Matrices et systèmes linéaires.** Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots + a_{1p} x_p = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \cdots + a_{2p} x_p = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \cdots + a_{np} x_p = b_n \end{cases}$$

peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_B.$$

On appelle  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$  la matrice des coefficients du système.  $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$  est le vecteur du second membre. Le vecteur  $X \in M_{p,1}(\mathbb{K})$  est une solution du système si et seulement si

$$AX = B.$$

Nous avons énoncé (sans démonstration) dans le cours sur les systèmes linéaires que :

**Théorème 1.** Un système d'équations linéaires n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

On avait démontré le résultat dans le cas de systèmes particuliers : les systèmes échelonnés réduits. On va démontrer plus bas qu'on peut toujours s'y ramener.

5.2. **Matrices inversibles et systèmes linéaires.** Considérons le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_B.$$

Alors  $A \in M_n(\mathbb{K})$  est une matrice carrée et  $B$  un vecteur de  $M_{n,1}(\mathbb{K})$ . Pour tout second membre, nous pouvons utiliser les matrices pour trouver la solution du système linéaire.

**Proposition 10.** Si la matrice  $A$  est inversible, alors la solution du système  $AX = B$  est unique et est :

$$\boxed{X = A^{-1}B.}$$

*Démonstration.* Si  $X = A^{-1}B$ , alors  $AX = A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = I \cdot B = B$ . Réciproquement si  $AX = B$ , alors nécessairement  $X = A^{-1}B$ .

□

Nous verrons bientôt que si la matrice n'est pas inversible, alors soit il n'y a pas de solution, soit une infinité.

**5.3. Les matrices élémentaires.** Pour calculer l'inverse d'une matrice  $A$ , et aussi pour résoudre des systèmes linéaires, nous avons utilisé trois opérations élémentaires sur les lignes qui sont :

- (1)  $L_i \leftarrow \lambda L_i$  avec  $\lambda \neq 0$  : on peut multiplier une ligne par un réel non nul (ou un élément de  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ ).
- (2)  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  avec  $\lambda \in \mathbb{K}$  (et  $j \neq i$ ) : on peut ajouter à la ligne  $L_i$  un multiple d'une autre ligne  $L_j$ .
- (3)  $L_i \leftrightarrow L_j$  : on peut échanger deux lignes.

Nous allons définir trois matrices élémentaires  $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i}$ ,  $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j}$ ,  $E_{L_i \leftrightarrow L_j}$  correspondant à ces opérations. Plus précisément, le produit  $E \times A$  correspondra à l'opération élémentaire sur  $A$ . Voici les définitions accompagnées d'exemples.

- (1) La matrice  $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i}$  est la matrice obtenue en multipliant par  $\lambda$  la  $i$ -ème ligne de la matrice identité  $I_n$ , où  $\lambda$  est un nombre réel non nul.

$$E_{L_2 \leftarrow 5L_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (2) La matrice  $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j}$  est la matrice obtenue en ajoutant  $\lambda$  fois la  $j$ -ème ligne de  $I_n$  à la  $i$ -ème ligne de  $I_n$ .

$$E_{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (3) La matrice  $E_{L_i \leftrightarrow L_j}$  est la matrice obtenue en permutant les  $i$ -ème et  $j$ -ème lignes de  $I_n$ .

$$E_{L_2 \leftrightarrow L_4} = E_{L_4 \leftrightarrow L_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Les opérations élémentaires sur les lignes sont réversibles, ce qui entraîne l'inversibilité des matrices élémentaires.

Le résultat de la multiplication d'une matrice élémentaire  $E$  par  $A$  est la matrice obtenue en effectuant l'opération élémentaire correspondante sur  $A$ . Ainsi :

- Lemme 1.**
- (1) La matrice  $E_{L_i \leftarrow \lambda L_i} \times A$  est la matrice obtenue en multipliant par  $\lambda$  la  $i$ -ème ligne de  $A$ .
  - (2) La matrice  $E_{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j} \times A$  est la matrice obtenue en ajoutant  $\lambda$  fois la  $j$ -ème ligne de  $A$  à la  $i$ -ème ligne de  $A$ .
  - (3) La matrice  $E_{L_i \leftrightarrow L_j} \times A$  est la matrice obtenue en permutant les  $i$ -ème et  $j$ -ème lignes de  $A$ .

*Démonstration.* Calcul direct.

□

**Exemple 15.**

(1)

$$E_{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}$$

(2)

$$E_{L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 7z_1 & x_2 - 7z_2 & x_3 - 7z_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}$$

(3)

$$E_{L_2 \leftrightarrow L_3} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$$

#### 5.4. Équivalence à une matrice échelonnée.

**Définition 8.** Deux matrices  $A$  et  $B$  sont dites *équivalentes par lignes* si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note  $A \sim B$ .

**Définition 9.** Une matrice est *échelonnée* si :

- le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros.

Elle est *échelonnée réduite* si en plus :

- le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1 ;
- et c'est le seul élément non nul de sa colonne.

Exemple d'une matrice échelonnée (à gauche) et échelonnée réduite (à droite) ; les \* désignent des coefficients quelconques, les + des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} + & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & + & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & + & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Théorème 2.** Étant donnée une matrice  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ , il existe une unique matrice échelonnée réduite  $U$  obtenue à partir de  $A$  par des opérations élémentaires sur les lignes.

Ce théorème permet donc de se ramener par des opérations élémentaires à des matrices dont la structure est beaucoup plus simple : les matrices échelonnées réduites.

On en déduit la démonstration théorème 1.

*Démonstration.* [(du théorème 1)] Il suffit d'appliquer le théorème 2 à la matrice du système linéaire considéré.

□

On va traiter un exemple avant de faire la démonstration du théorème 2.

**Exemple 16.** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**A. Passage à une forme échelonnée.**

Première itération de la boucle, étape A.1. Le choix du pivot est tout fait, on garde  $a_{11}^1 = 1$ .

Première itération de la boucle, étape A.2. On ne fait rien sur la ligne 2 qui contient déjà un zéro en bonne position et on remplace la ligne 3 par  $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$ . On obtient

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Deuxième itération de la boucle, étape A.1. Le choix du pivot est tout fait, on garde  $a_{22}^2 = 2$ .

Deuxième itération de la boucle, étape A.2. On remplace la ligne 3 avec l'opération  $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ . On obtient

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est échelonnée.

**B. Passage à une forme échelonnée réduite.**

Étape B.1, homothéties. On multiplie la ligne 2 par  $\frac{1}{2}$  et la ligne 3 par  $-\frac{1}{2}$  et l'on obtient

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étape B.2, première itération. On ne touche plus à la ligne 3 et on remplace la ligne 2 par  $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3$  et  $L_1 \leftarrow L_1 - 4L_3$ . On obtient

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étape B.2, deuxième itération. On ne touche plus à la ligne 2 et on remplace la ligne 1 par  $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$ . On obtient

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

qui est bien échelonnée et réduite.

*Démonstration.* [(du théorème 2)] Nous admettons l'unicité.

L'existence se démontre grâce à l'algorithme de Gauss. L'idée générale consiste à utiliser des substitutions de lignes pour placer des zéros là où il faut de façon à créer d'abord une forme échelonnée, puis une forme échelonnée réduite.

Soit  $A$  une matrice  $n \times p$  quelconque.

**Partie A. Passage à une forme échelonnée.****Étape A.1. Choix du pivot.**

On commence par inspecter la première colonne. Soit elle ne contient que des zéros, auquel cas on passe directement à l'étape A.3, soit elle contient au moins un terme non nul. On choisit alors un tel terme, que l'on appelle le **pivot**. Si c'est le terme  $a_{11}$ , on passe directement à l'étape A.2; si c'est un terme  $a_{i1}$  avec  $i \neq 1$ , on échange les lignes 1 et  $i$  ( $L_1 \leftrightarrow L_i$ ) et on passe à l'étape A.2.

Au terme de l'étape A.1, soit la matrice  $A$  a sa première colonne nulle (à gauche) ou bien on obtient une matrice équivalente dont le premier coefficient  $a'_{11}$  est non nul (à droite) :

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} = A \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1p} \\ a'_{21} & a'_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{ij} & \cdots & a'_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a'_{np} \end{pmatrix} \sim A.$$

**Étape A.2. Élimination.**

On ne touche plus à la ligne 1, et on se sert du pivot  $a'_{11}$  pour éliminer tous les termes  $a'_{i1}$  (avec  $i \geq 2$ ) situés sous le pivot. Pour cela, il suffit de remplacer la ligne  $i$  par elle-même moins  $\frac{a'_{i1}}{a'_{11}} \times$  la ligne 1, ceci pour  $i = 2, \dots, n$  :  $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a'_{21}}{a'_{11}} L_1$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a'_{31}}{a'_{11}} L_1, \dots$

Au terme de l'étape A.2, on a obtenu une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1p} \\ 0 & a''_{22} & \cdots & a''_{2j} & \cdots & a''_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a''_{i2} & \cdots & a''_{ij} & \cdots & a''_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a''_{n2} & \cdots & a''_{nj} & \cdots & a''_{np} \end{pmatrix} \sim A.$$

**Étape A.3. Boucle.**

Au début de l'étape A.3, on a obtenu dans tous les cas de figure une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a^1_{11} & a^1_{12} & \cdots & a^1_{1j} & \cdots & a^1_{1p} \\ 0 & a^1_{22} & \cdots & a^1_{2j} & \cdots & a^1_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a^1_{i2} & \cdots & a^1_{ij} & \cdots & a^1_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a^1_{n2} & \cdots & a^1_{nj} & \cdots & a^1_{np} \end{pmatrix} \sim A$$

dont la première colonne est bien celle d'une matrice échelonnée. On va donc conserver cette première colonne. Si  $a^1_{11} \neq 0$ , on conserve aussi la première ligne, et l'on repart avec l'étape A.1 en l'appliquant cette fois à la sous-matrice  $(n-1) \times (p-1)$  (ci-dessous à gauche : on "oublie" la première ligne et la première colonne de  $A$ ) ; si  $a^1_{11} = 0$ , on repart avec l'étape A.1 en l'appliquant à la sous-matrice  $n \times (p-1)$  (à droite, on "oublie" la première colonne) :

$$\begin{pmatrix} a^1_{22} & \cdots & a^1_{2j} & \cdots & a^1_{2p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a^1_{i2} & \cdots & a^1_{ij} & \cdots & a^1_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a^1_{n2} & \cdots & a^1_{nj} & \cdots & a^1_{np} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a^1_{12} & \cdots & a^1_{1j} & \cdots & a^1_{1p} \\ a^1_{22} & \cdots & a^1_{2j} & \cdots & a^1_{2p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a^1_{i2} & \cdots & a^1_{ij} & \cdots & a^1_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a^1_{n2} & \cdots & a^1_{nj} & \cdots & a^1_{np} \end{pmatrix}$$

Au terme de cette deuxième itération de la boucle, on aura obtenu une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \cdots & a_{1j}^1 & \cdots & a_{1p}^1 \\ 0 & a_{22}^2 & \cdots & a_{2j}^2 & \cdots & a_{2p}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ij}^2 & \cdots & a_{ip}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nj}^2 & \cdots & a_{np}^2 \end{pmatrix} \sim A,$$

et ainsi de suite.

Comme chaque itération de la boucle travaille sur une matrice qui a une colonne de moins que la précédente, alors au bout d'au plus  $p-1$  itérations de la boucle, on aura obtenu une matrice échelonnée.

### Partie B. Passage à une forme échelonnée réduite.

#### Étape B.1. Homothéties.

On repère le premier élément non nul de chaque ligne non nulle, et on multiplie cette ligne par l'inverse de cet élément. Exemple : si le premier élément non nul de la ligne  $i$  est  $\alpha \neq 0$ , alors on effectue  $L_i \leftarrow \frac{1}{\alpha} L_i$ . Ceci crée une matrice échelonnée avec des 1 en position de pivots.

#### Étape B.2. Élimination.

On élimine les termes situés au-dessus des positions de pivot comme précédemment, en procédant à partir du bas à droite de la matrice. Ceci ne modifie pas la structure échelonnée de la matrice en raison de la disposition des zéros dont on part.

□

**Définition 10.** On appelle rang d'une matrice le nombre de ligne non nulle dans sa forme échelonnée réduite.

### 5.5. Matrices élémentaires et inverse d'une matrice.

**Théorème 3.** Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$ . La matrice  $A$  est inversible si et seulement si sa forme échelonnée réduite est la matrice identité  $I_n$ .

*Démonstration.* Notons  $U$  la forme échelonnée réduite de  $A$ . Et notons  $E$  le produit de matrices élémentaires tel que  $EA = U$ .

$\Leftarrow$  Si  $U = I_n$  alors  $EA = I_n$ . Ainsi par définition,  $A$  est inversible à gauche. On sait (mais on ne l'a pas encore démontré) qu'alors  $A$  est inversible, et  $A^{-1} = E$ .

$\Rightarrow$  Nous allons montrer que si  $U \neq I_n$ , alors  $A$  n'est pas inversible.

- Supposons  $U \neq I_n$ . Alors la dernière ligne de  $U$  est nulle (sinon il y aurait un pivot sur chaque ligne donc ce serait  $I_n$ ).
- Cela entraîne que  $U$  n'est pas inversible : en effet, pour toute matrice carrée  $V$ , la dernière ligne de  $UV$  est nulle ; on n'aura donc jamais  $UV = I_n$ .
- Alors,  $A$  n'est pas inversible non plus : en effet, si  $A$  était inversible, on aurait  $U = EA$  et  $U$  serait inversible comme produit de matrices inversibles ( $E$  est inversible car c'est un produit de matrices élémentaires qui sont inversibles).

□

**Remarque.** Justifions maintenant notre méthode pour calculer  $A^{-1}$ .

Nous partons de  $(A|I)$  pour arriver par des opérations élémentaires sur les lignes à  $(I|B)$ . Montrons que  $B = A^{-1}$ . Faire une opération élémentaire signifie multiplier à gauche par une des matrices

élémentaires. Notons  $E$  le produit de ces matrices élémentaires. Dire que l'on arrive à la fin du processus à  $I$  signifie  $EA = I$ . Donc  $A^{-1} = E$ . Comme on fait les mêmes opérations sur la partie droite du tableau, alors on obtient  $EI = B$ . Donc  $B = E$ . Conséquence :  $B = A^{-1}$ .

**Corollaire 1.** Soit  $A$  une matrice carrée à coefficient dans  $\mathbb{K}$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) La matrice  $A$  est inversible.
- (ii) Le système linéaire  $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$  a une unique solution  $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ .
- (iii) Pour tout second membre  $B$ , le système linéaire  $AX = B$  a une unique solution  $X$ .

*Démonstration.* Nous avons déjà vu (i)  $\implies$  (ii) et (i)  $\implies$  (iii). Par ailleurs (iii)  $\implies$  (ii) est immédiat.

Nous allons montrer (ii)  $\implies$  (i). Nous raisonnons par contraposée : nous allons montrer la proposition équivalente non(ii)  $\implies$  non(i). Si  $A$  n'est pas inversible, alors sa forme échelonnée réduite  $U$  contient un premier zéro sur sa diagonale, disons à la place  $\ell$ . Alors  $U$  à la forme suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & c_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots & & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & c_{\ell-1} & & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & & & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}. \quad \text{On note} \quad X = \begin{pmatrix} -c_1 \\ \vdots \\ -c_{\ell-1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Alors  $X$  n'est pas le vecteur nul, mais  $UX$  est le vecteur nul. Comme  $A = E^{-1}U$ , alors  $AX$  est le vecteur nul. Nous avons donc trouvé un vecteur non nul  $X$  tel que  $AX = 0$ .

□

### Mini-exercices.

- (1) Exprimer les systèmes linéaires suivants sous forme matricielle et les résoudre en inversant la

$$\text{matrice : } \begin{cases} 2x + 4y = 7 \\ -2x + 3y = -14 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + z = 1 \\ -2y + 3z = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + t = \alpha \\ x - 2y = \beta \\ x + y + t = 2 \\ y + t = 4 \end{cases}.$$

- (2) Écrire les matrices  $4 \times 4$  correspondant aux opérations élémentaires :  $L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{4}L_2$ ,  $L_1 \leftrightarrow L_4$ . Sans calculs, écrire leurs inverses. Écrire la matrice  $4 \times 4$  de l'opération  $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 + 3L_4$ .
- (3) Écrire les matrices suivantes sous forme échelonnée, puis échelonnée réduite :  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ .

## 6. MATRICES TRIANGULAIRES, TRANSPOSITION, TRACE, MATRICES SYMÉTRIQUES

**6.1. Matrices triangulaires, matrices diagonales.** Soit  $A$  une matrice de taille  $n \times n$ . On dit que  $A$  est *triangulaire inférieure* si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls, autrement dit :

$$i < j \implies a_{ij} = 0.$$

Une matrice triangulaire inférieure a la forme suivante :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On dit que  $A$  est **triangulaire supérieure** si ses éléments en-dessous de la diagonale sont nuls, autrement dit :

$$i > j \implies a_{ij} = 0.$$

Une matrice triangulaire supérieure a la forme suivante :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**Exemple 17.** Deux matrices triangulaires inférieures (à gauche), une matrice triangulaire supérieure (à droite) :

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Une matrice qui est triangulaire inférieure **et** triangulaire supérieure est dite **diagonale**. Autrement dit :  $i \neq j \implies a_{ij} = 0$ .

**Exemple 18.** Exemples de matrices diagonales :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

**Exemple 19** (Puissances d'une matrice diagonale). Si  $D$  est une matrice diagonale, il est très facile de calculer ses puissances  $D^p$  (par récurrence sur  $p$ ) :

$$D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \implies D^p = \begin{pmatrix} \alpha_1^p & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_2^p & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1}^p & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n^p \end{pmatrix}$$

**Théorème 4.** Une matrice  $A$  de taille  $n \times n$ , triangulaire, est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls.

*Démonstration.* Supposons que  $A$  soit triangulaire supérieure.

- Si les éléments de la diagonale sont tous non nuls, alors la matrice  $A$  est déjà sous la forme échelonnée. En multipliant chaque ligne  $i$  par l'inverse de l'élément diagonal  $a_{ii}$ , on obtient des 1 sur la diagonale. De ce fait, la forme échelonnée réduite de  $A$  sera la matrice identité. Le théorème 3 permet de conclure que  $A$  est inversible.
- Inversement, supposons qu'au moins l'un des éléments diagonaux soit nul et notons  $a_{\ell\ell}$  le premier élément nul de la diagonale. En multipliant les lignes 1 à  $\ell - 1$  par l'inverse de leur élément diagonal, on obtient une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & & \cdots & * \\ 0 & \ddots & * & \cdots & & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & * & & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \mathbf{0} & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & & & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}.$$

Il est alors clair que la colonne numéro  $\ell$  de la forme échelonnée réduite ne contiendra pas de 1 comme pivot. La forme échelonnée réduite de  $A$  ne peut donc pas être  $I_n$  et par le théorème 3,  $A$  n'est pas inversible.

Dans le cas d'une matrice triangulaire inférieure, on utilise la transposition (qui fait l'objet de la section suivante) et on obtient une matrice triangulaire supérieure. On applique alors la démonstration ci-dessus.

□

**6.2. La transposition.** Soit  $A$  la matrice de taille  $n \times p$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

**Définition 11.** On appelle *matrice transposée* de  $A$  la matrice  ${}^tA$  de taille  $p \times n$  définie par :

$${}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Autrement dit : le coefficient à la place  $(i, j)$  de  ${}^tA$  est  $a_{ji}$ . Ou encore la  $i$ -ème ligne de  $A$  devient la  $i$ -ème colonne de  ${}^tA$  (et réciproquement la  $j$ -ème colonne de  ${}^tA$  est la  $j$ -ème ligne de  $A$ ).

**Exemple 20.** La transposée de  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$  est  $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix}$ . La transposée de  $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  est

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}$  et la transposée de  $(1 \quad -2 \quad 5)$  est  $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes :

**Théorème 5.**

- (1)  ${}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B$
- (2)  ${}^t(\alpha A) = \alpha {}^t A$
- (3)  ${}^t({}^t A) = A$
- (4)  ${}^t(AB) = {}^t B {}^t A$
- (5) Si  $A$  est inversible, alors  ${}^t A$  l'est aussi et on a  $({}^t A)^{-1} = {}^t(A^{-1})$ .

Notez bien l'inversion :  ${}^t(AB) = {}^t B {}^t A$ , comme pour  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

Le résultat suivant est important, mais de démonstration trop difficile pour cette année.

**Théorème 6.** (admis) Le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée.

**6.3. La trace.** Dans le cas d'une matrice carrée de taille  $n \times n$ , les éléments  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  sont appelés les *éléments diagonaux*.

Sa *diagonale principale* est la diagonale  $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**Définition 12.** La *trace* de la matrice  $A$  est le nombre obtenu en additionnant les éléments diagonaux de  $A$ . Autrement dit,

$$\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

**Exemple 21.**

- Si  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ , alors  $\text{tr } A = 2 + 5 = 7$ .
- Pour  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 8 \\ 11 & 0 & -10 \end{pmatrix}$ ,  $\text{tr } B = 1 + 2 - 10 = -7$ .

**Théorème 7.** Soient  $A$  et  $B$  deux matrices  $n \times n$ . Alors :

- (1)  $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$ ,
- (2)  $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr } A$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,
- (3)  $\text{tr}({}^t A) = \text{tr } A$ ,
- (4)  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .

*Démonstration.*

- (1) Pour tout  $1 \leq i \leq n$ , le coefficient  $(i, i)$  de  $A + B$  est  $a_{ii} + b_{ii}$ . Ainsi, on a bien  $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$ .
- (2) On a  $\text{tr}(\alpha A) = \alpha a_{11} + \dots + \alpha a_{nn} = \alpha(a_{11} + \dots + a_{nn}) = \alpha \text{tr } A$ .
- (3) Étant donné que la transposition ne change pas les éléments diagonaux, la trace de  $A$  est égale à la trace de  ${}^t A$ .
- (4) Notons  $c_{ij}$  les coefficients de  $AB$ . Alors par définition

$$c_{ii} = a_{i1}b_{1i} + a_{i2}b_{2i} + \dots + a_{in}b_{ni}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) = & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} \\ & + a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{n2} \\ & \vdots \\ & + a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \cdots + a_{nn}b_{nn}. \end{aligned}$$

On peut réarranger les termes pour obtenir

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) = & a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12} + \cdots + a_{n1}b_{1n} \\ & + a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{n2}b_{2n} \\ & \vdots \\ & + a_{1n}b_{n1} + a_{2n}b_{n2} + \cdots + a_{nn}b_{nn}. \end{aligned}$$

En utilisant la commutativité de la multiplication dans  $\mathbb{K}$ , la première ligne devient

$$b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} + \cdots + b_{1n}a_{n1}$$

qui vaut le coefficient  $(1, 1)$  de  $BA$ . On note  $d_{ij}$  les coefficients de  $BA$ . En faisant de même avec les autres lignes, on voit finalement que

$$\operatorname{tr}(AB) = d_{11} + \cdots + d_{nn} = \operatorname{tr}(BA).$$

□

#### 6.4. Matrices symétriques.

**Définition 13.** Une matrice  $A$  de taille  $n \times n$  est *symétrique* si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si

$$A = {}^t A,$$

ou encore si  $a_{ij} = a_{ji}$  pour tout  $i, j = 1, \dots, n$ . Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

**Exemple 22.** Les matrices suivantes sont symétriques :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Exemple 23.** Pour une matrice  $B$  quelconque, les matrices  $B \cdot {}^t B$  et  ${}^t B \cdot B$  sont symétriques.

Preuve :  ${}^t(B \cdot {}^t B) = {}^t({}^t B)^t B = B^t B$ . Idem pour  ${}^t B B$ .

#### 6.5. Matrices antisymétriques.

**Définition 14.** Une matrice  $A$  de taille  $n \times n$  est *antisymétrique* si

$${}^t A = -A,$$

c'est-à-dire si  $a_{ij} = -a_{ji}$  pour tout  $i, j = 1, \dots, n$ .

**Exemple 24.**

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -4 & 0 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarquons que les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont toujours tous nuls.

**Exemple 25.** Toute matrice est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Preuve : Soit  $A$  une matrice. Définissons  $B = \frac{1}{2}(A + {}^t A)$  et  $C = \frac{1}{2}(A - {}^t A)$ . Alors d'une part  $A = B + C$ ; d'autre part  $B$  est symétrique, car  ${}^t B = \frac{1}{2}({}^t A + {}^t({}^t A)) = \frac{1}{2}({}^t A + A) = B$ ; et enfin  $C$  est antisymétrique, car  ${}^t C = \frac{1}{2}({}^t A - {}^t({}^t A)) = -C$ .

Exemple :

$$\text{Pour } A = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 8 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad A = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}}_{\text{symétrique}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{antisymétrique}}.$$

### Mini-exercices.

- (1) Montrer que la somme de deux matrices triangulaires supérieures reste triangulaire supérieure. Montrer que c'est aussi valable pour le produit.
- (2) Montrer que si  $A$  est triangulaire supérieure, alors  ${}^t A$  est triangulaire inférieure. Et si  $A$  est diagonale ?
- (3) Soit  $A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ . Calculer  ${}^t A \cdot A$ , puis  $A \cdot {}^t A$ .
- (4) Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ . Calculer  $\text{tr}(A \cdot {}^t A)$ .
- (5) Soit  $A$  une matrice de taille  $2 \times 2$  inversible. Montrer que si  $A$  est symétrique, alors  $A^{-1}$  aussi. Et si  $A$  est antisymétrique ?
- (6) Montrer que la décomposition d'une matrice sous la forme "symétrique + antisymétrique" est unique.