

Espaces vectoriels de dimension finie

Préparation

- 1) Quand et comment introduit-on les vecteurs au lycée ?
- 2) Rappeler les définitions d'un *espace-vectoriel* et d'un *sous-espace vectoriel*. Donner des exemples.
- 3) Qu'appelle-t-on *sous-espace vectoriel engendré* par une partie ?
Comment définit-on la somme de deux s.e.v. ? Quand dit-on que deux sous-espaces sont en *somme directe* ? Qu'ils sont *supplémentaires* ?
- 4) Qu'est-ce qu'une *famille libre* ? Une *famille génératrice* ? Une *base* ? Donner des exemples.
Comment caractérise-t-on le fait que deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires ?
- 5) Quand dit-on qu'un espace vectoriel est de *dimension finie* ? Qu'est-ce que le *rang* d'une famille de vecteurs ? Rappeler le théorème de la base incomplète.
- 6) Pourquoi travailler cette notion en Master MEEF ?

Exercice n°1

Les sous-ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^4 ? Si oui, en donner une base.
 $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, 3x + 2y + t = 0\}$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x - t + 2z = 1\}$, $G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, xy = 0\}$.

Exercice n°2

Dans \mathbb{R}^3 , montrer que les vecteurs $a_1 = (1, 2, 3)$ et $a_2 = (2, -1, 1)$ engendrent le même sous-espace vectoriel que $b_1 = (1, 0, 1)$ et $b_2 = (0, 1, 1)$:

- 1) en écrivant b_1 et b_2 comme combinaisons linéaires de a_1 et de a_2 .
- 2) en donnant une équation qui caractérise le sous-espace vectoriel engendré par a_1 et a_2 .

Exercice n°3

On considère les vecteurs suivants de \mathbb{R}^4 :

$$v_1 = (1, 0, 1, 2) \quad v_2 = (2, 3, 1, -1) \quad v_3 = (1, 1, -1, 0) \quad v_4 = (0, 1, 2, 3) \quad v_5 = (2, 1, 0, 2)$$

1. La famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ est-elle libre ?
2. Montrer que v_5 appartient à $\text{Vect}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.
3. Est-ce que (v_1, v_2, v_3, v_4) est une base de \mathbb{R}^4 ?

Exercice n°4

Vérifier que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 et donner une base pour chacun d'eux :

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 2z = 0\}, \quad E_2 = \{(\lambda + \mu, \lambda - \mu, \lambda + \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\},$$

$$E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y + z = 0 \text{ et } x = 0\}, \quad E_4 = \{(u, 2u, u) \mid u \in \mathbb{R}\}.$$

Exercice n°5

Soient $a = (1, -1, 1)$, $b = (0, -1, 2)$ et $c = (1, -2, 3)$ trois éléments de l'espace vectoriel \mathbb{R}^3 .

1. Montrer que (a, b, c) est un système lié.
2. Soit F le sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 engendré par (a, b, c) . Donner une base de F .
3. Soit $G = \{(x, y, z) \mid x + 2y + z = 0\}$. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 et en donner une base.
4. Montrer que $F = G$.

Exercice n°6

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel sur \mathbb{R} des polynômes à coefficients réels.

1. Montrer que le sous-ensemble $\mathbb{R}_3[X]$ de $\mathbb{R}[X]$ formé des polynômes de degré au plus 3 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
2. Donner une base de $\mathbb{R}_3[X]$. Quelle est sa dimension ?
3. La famille $\{X + 1, 2X - 1, 1 + 2X + X^2 + X^3, X^2 - X^3\}$ est-elle libre ? Est-elle génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$?

Exercice n°7

Dans l'espace vectoriel $E = C^\infty(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$, montrer que $(\exp, x \mapsto xe^x, x \mapsto \ln x)$ est une famille libre. Est-elle génératrice de E ?

Exercice n°8

Soient F et G deux sous-espaces d'un espace vectoriel E .

- 1) Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.
- 2) En déduire que si $F \neq E$ et $G \neq E$, alors $F \cup G \neq E$.

Exercice n°9

E est un \mathbb{K} -espace vectoriel, F, G, H sont des sous-espaces vectoriels de E .

Dire (démonstration à l'appui) si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux (faire des dessins).

- 1) Le complémentaire d'un hyperplan est une droite.
- 2) Si $F \cap G = G \cap H = H \cap F = \{0\}$ alors $\dim(F + G + H) = \dim F + \dim G + \dim H$.
- 3) Si H et K sont deux hyperplans de E alors $H \cup K \neq E$.
- 4) Si P_1 et P_2 sont deux plans de E , vérifiant $P_1 \cap P_2 = \{0\}$ alors $\dim E \geq 4$.

Exercice n°10 (CAPES 1998)

Soient ABC un triangle non aplati et M un point du plan affine. Montrer que si λ, μ et ν ne sont pas tous nuls et vérifient $\lambda \overrightarrow{MA} + \mu \overrightarrow{MB} + \nu \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ alors on a $\lambda + \mu + \nu \neq 0$.

Exercice n°11 (Épreuve sur dossier 2016)

Dans un tétraèdre $ABCD$, I, J et K sont respectivement les milieux de $[AB]$, $[BD]$ et $[BC]$.

Les points E et F sont définis par $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AJ}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CJ}$. Démontrer que I, E, F et K sont coplanaires.

Exercice n°12 (Épreuve sur dossier 2016)

L'espace est rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dans ce repère, on définit les quatre points $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 0)$, $C(0; -3; 1)$ et $D(-1; 0; 2)$.

Les droites (AB) et (CD) sont-elles sécantes ?


Exercice n°13 (Épreuve sur dossier 2018)

$ABCD$ est un tétraèdre.

I est le milieu du segment $[AD]$.

J est le point de la face BCD défini par : $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

- 1) On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.
Déterminer les coordonnées du point K , intersection de la droite (IJ) et du plan (ABC) .
- 2) Sans utiliser de repère, donner une construction du point K .



Exercice n°14 (CAPES 2019 - Première composition)

1) Donner sans justification une base du \mathbb{C} -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ puis une base du \mathbb{R} -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

2) Montrer que $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{C}^2 \right\}$ est un sous-espace vectoriel du \mathbb{R} -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

En donner une base.

Applications linéaires

Préparation

1) Rappeler la définition d'une **application linéaire** entre deux espaces vectoriels E et F . Qu'est-ce qu'un **endomorphisme** ?

2) Rappeler les définitions des exemples géométriques classiques (homothéties, projections, symétries) et les illustrer graphiquement. Donner d'autres exemples.

3) Rappeler les définitions du **noyau** $\ker f$ et de l'**image** $\text{Im } f$ d'un endomorphisme f . Énoncer le théorème du rang.

4) Qu'appelle-t-on **valeur propre** et **sous-espace propre** associé d'un endomorphisme ? Donner des exemples.

5) Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies munis respectivement des bases $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$. Rappeler la définition de la **matrice** de l'application linéaire $f : E \rightarrow F$ relativement aux bases \mathcal{B} et \mathcal{C} . Quels sont les effets de changements de bases ?

Exercice n°15

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 - 2x_2 - 3x_3, x_1 - 2x_2 - 3x_3, -x_1 + 2x_2 + 3x_3)$$

Montrer que f est linéaire et déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$. A-t-on $\text{Im } f \subset \ker f$? $\ker f \subset \text{Im } f$?

Exercice n°16

Soit F le sous-ensemble de \mathbb{R}^4 constitué des vecteurs $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ tels que

$$x + 2y - 3z + t = 0 \quad \text{et} \quad x - y + z - 2t = 0.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 .
2. Déterminer une base \mathcal{B} de F . Compléter la famille \mathcal{B} en une base de \mathbb{R}^4 .

Exercice n°17

Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(x, y, z, t) = (y - z + t, x - 2y + z - 2t, -2x + y + z + t).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de f et l'image de f .
3. Déterminer des équations cartésiennes de $\text{Im } f$.

Exercice n°18

1. Démontrer qu'il est impossible de trouver une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vérifiant $\ker f = \text{Im } f$.
2. Donner un exemple d'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vérifiant $\ker f = \text{Im } f$.

Exercice n°19

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tel que $a \neq 0$. On note $\mathcal{E}(a, b, c)$ l'ensemble des suites complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$$

- 1) Montrer que $\mathcal{E}(a, b, c)$ est un espace vectoriel.
- 2) Montrer pour tout x et tout y de \mathbb{C} , il existe un unique élément $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{E}(a, b, c)$ tel que $u_0 = x$ et $u_1 = y$. On note $F(x, y)$ cet élément.
- 3) Montrer que l'application $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathcal{E}(a, b, c)$, $(x, y) \mapsto F(x, y)$ est un isomorphisme de \mathbb{C}^2 sur $\mathcal{E}(a, b, c)$. En déduire la dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{E}(a, b, c)$.
- 4) Soit $r \in \mathbb{C}^*$. Montrer que la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un élément de $\mathcal{E}(a, b, c)$ si et seulement si r est solution de l'équation caractéristique $(C) : ax^2 + bx + c = 0$.
 - a) On suppose que l'équation (C) admet deux racines distinctes r_1 et r_2 dans \mathbb{C} . Montrer que les deux suites $(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de $\mathcal{E}(a, b, c)$.
 - b) On suppose que l'équation (C) admet une racine double r non nulle. Montrer que les deux suites $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(nr^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de $\mathcal{E}(a, b, c)$.
- 5) On considère la suite de Fibonacci $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 0 \quad u_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$$

Pour tout entier naturel n , expliciter u_n en fonction de n .

Exercice n°20 (CAPES 2016 - Première composition)

Pour tout naturel n , $\mathbb{R}_n[X]$ désigne l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n .

Soit n un entier supérieur ou égal à 2 et soient a_1, \dots, a_n des réels deux à deux distincts.

Pour tout entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on considère le polynôme

$$L_k(X) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}.$$

On considère l'application $F : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \rightarrow \mathbb{R}^n \\ P & \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)). \end{cases}$

- 1) Montrer que F est une application linéaire.
- 2) Soit (e_1, \dots, e_n) la base canonique de \mathbb{R}^n . Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer qu'il existe un polynôme P dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $F(P) = e_k$.
- 3) Montrer que F est surjective, puis justifier que F est bijective.

Exercice n°21

Soient E un espace vectoriel de dimension 4, $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ une base de E , F un espace vectoriel de dimension 5, $\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}$ une base de F .

Construire, lorsque cela est possible, une application linéaire u de E dans F qui vérifie la condition :

- | | |
|--|---|
| 1) $\text{Im } u = \text{vect}(f_1, f_2, f_3)$ | 2) $\text{Im } u = \text{vect}(f_4)$ |
| 3) $\text{Im } u = F$ | 4) $\text{ker } u = \text{vect}(e_3)$ |
| 5) $\text{ker } u = \text{vect}(e_1, e_3)$ et $\text{Im } u = \text{vect}(f_1, f_2)$ | 6) $\text{ker } u = \text{vect}(e_3, e_4)$ et $\text{Im } u = \text{vect}(f_1, f_2, f_3)$ |

Exercice n°22 (CAPES 2020 - Première composition)

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on définit le polynôme $\phi(P)$ par :

$$\phi(P)(X) = nXP(X) + X(1 - X)P'(X).$$

1) Démontrer que ϕ est un endomorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$ des fonctions polynômiales à coefficients réels de degré au plus n .

2) On appelle k -ième polynôme de Bernstein de degré n le polynôme

$$B_{n,k}(X) = \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}.$$

Démontrer que pour tout entier k entre 0 et n , on a

$$\phi(B_{n,k}(X)) = kB_{n,k}(X).$$

3) En déduire que $(B_{n,0}, \dots, B_{n,n})$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et que ϕ est diagonalisable.

4) Démontrer que ϕ n'est pas bijectif.

Exercice n°23

Soient E un espace vectoriel et $f : E \rightarrow E$ une application linéaire.

1) Montrer que f est une homothétie si et seulement si, pour tout x de E , la famille $(x, f(x))$ est liée.

2) On suppose que $f^3 = 0$. f est-elle injective ? surjective ?

3) On suppose que $f^3 + 2f^2 - Id = 0$. Montrer que f est inversible et déterminer son inverse.

Exercice n°24

Soit E l'espace vectoriel réel des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . Soit u l'endomorphisme de E défini par :

$$\forall f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, u(f)(x) = f(-x)$$

Déterminer les valeurs propres de u et montrer que E est somme directe des sous-espaces propres associés.

Exercice n°25

On appelle projecteur d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E , tout endomorphisme p de E vérifiant $p \circ p = p$. Montrer que si p est un projecteur de E alors $E = \ker p \oplus \text{Im } p$ et $\text{Im } p = \ker(id_E - p)$.