

## Feuille d'exercices 1

**Exercice 1.** Soient  $\Omega$  un ensemble et  $A$  et  $B$  des parties de  $\Omega$ .

Simplifier les expressions  $E = (A \cup B) \cap (A^c \cup B) \cap (A \cap B^c)$  et  $F = (A \cup B) \cap (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$ .

**Exercice 2.** Soient  $\Omega$  un ensemble et  $A, B, C$  des parties de  $\Omega$ .

Parmi les propositions suivantes, prouver celles qui sont vraies et donner des contre-exemples pour les autres :

1.  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
2.  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
3.  $(A \cup B = \Omega) \implies (A \subset B^c)$
4.  $(A \cup B = \Omega) \implies (A^c \subset B)$
5.  $(A \cup B = \Omega \text{ et } A \cap B = \emptyset) \implies (A = B^c)$
6.  $(A \subset B^c) \implies (A \cup B = \Omega)$
7.  $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ .

**Exercice 3. Fonctions indicatrices** Soit  $A$  un sous-ensembles d'un ensemble  $\Omega$ . On note  $\mathbb{1}_A$  la fonction indicatrice de  $A$  définie sur  $\Omega$  par  $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$  si  $\omega$  appartient à  $A$  et  $\mathbb{1}_A(\omega) = 0$  sinon.

Que vaut  $\mathbb{1}_A$  lorsque  $A = \emptyset$  ? lorsque  $A = \Omega$  ?

Dans le cas général, montrer que l'on a :  $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$ ,  $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$ ,  $\mathbb{1}_{A^c} = 1 - \mathbb{1}_A$ ,  $\mathbb{1}_A \mathbb{1}_{A^c} = 0$ ,  $\mathbb{1}_A \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_A$ .

*Application* : utiliser les fonctions indicatrices pour simplifier les expressions  $(A^c \cup B) \cap (A \cap B^c)$  et  $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$ .

**Exercice 4.** Soient  $A, B$  et  $C$  trois parties d'un ensemble  $\Omega$ .

Montrer que  $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$ .

Montrer que  $\#(A \cup B \cup C) = \#A + \#B + \#C - \#(A \cap B) - \#(B \cap C) - \#(C \cap A) + \#(A \cap B \cap C)$ .

Soient  $A_1, \dots, A_n$  des parties de  $\Omega$ . Donner et démontrer une formule pour le cardinal de  $\bigcup_{i=1}^n A_i$  en fonction de ceux des intersections.

**Exercice 5.** Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles de cardinaux respectifs  $n$  et  $k$ . On note  $F^E$  l'ensemble des applications de  $E$  dans  $F$  :  $F^E = \{f \mid f : E \rightarrow F\}$ . Quel est le cardinal de  $F^E$  ?

**Exercice 6.** Soit  $E$  un ensemble de cardinal  $n$  (on notera  $\#E = n$ ). On note  $\mathcal{P}(E)$  l'ensemble des parties de  $E$  :  $\mathcal{P}(E) = \{F \mid F \subset E\}$ . Quel est le cardinal de  $\mathcal{P}(E)$  ?

**Exercice 7.** Donnez une bijection entre  $\mathcal{P}(E)$  et  $\{0, 1\}^E$ .

**Exercice 8.** Les  $n$  chevaliers de la table ronde doivent s'installer pour dîner. Combien y a-t-il de plans de table possibles ?

**Exercice 9.** On jette 10 fois successivement une pièce de monnaie. Comment représenter le résultat d'une telle épreuve ? Combien a-t-on de résultats différents ? Combien de résultats comptent exactement trois piles ? Combien de résultats comptent au moins un pile ?

**Exercice 10.** Une urne contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5 et 8 boules noires numérotées de 6 à 13. On tire successivement 6 boules de l'urne ; à chaque fois, on note le numéro de la boule tirée et on la remet ensuite dans l'urne.

Comment représenter le résultat d'une telle épreuve ?

Combien y a-t-il de tirages possibles ?

Combien de tirages amènent

- 1 boule noire au plus ?
- 3 boules blanches exactement ?
- 1 boule blanche au moins ?
- 5 boules noires et une blanche, dans cet ordre ?
- 5 boules noires et une blanche, dans n'importe quel ordre ?

**Exercice 11.** Reprendre l'exercice précédent en supposant cette fois que les boules ne sont pas remises dans l'urne après tirage.

**Exercice 12.** On dispose de 13 livres différents : 4 de mathématique, 6 de physique et 3 de chimie. On les range au hasard. Combien de façons y a-t-il de les ranger sur une même étagère ?

Combien de façons y a-t-il de les ranger en regroupant les livres de mathématique ?

Combien de façons y a-t-il de les ranger en les regroupant par matière ?

Justifier vos réponses.

**Exercice 13.** Soient  $E$  un ensemble de cardinal  $n$  et  $k$  un entier. On note

$$\binom{n}{k} = \#\{F \mid F \subset E \text{ et } \#F = k\}.$$

Montrer les égalités suivantes :

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

En utilisant la formule du binôme calculer

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}, \quad \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}, \quad \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}.$$

**Exercice 14.** Soient  $n$  un entier et  $k, i$  deux entiers inférieurs à  $n$ .

- Comptez le nombre de parties à  $k+1$  éléments de  $\{1, 2, \dots, n+1\}$  dont le plus grand élément est  $i+1$ .
- Déduisez-en  $\sum_{i=0}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ .
- Retrouvez ce résultat par une récurrence.
- Montrez que  $\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \binom{m+n+1}{n}$ .

**Exercice 15.** Montrer l'identité de Vandermonde  $\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$ , en déduire  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ .

**Exercice 16.** Soient  $0 < k \leq n$  deux entiers. Comptez de deux manières le nombre de couples  $(x, P)$  où  $P$  est une partie de  $\{1, 2, \dots, n\}$  de cardinal  $k$  et  $x \in P$  et montrez que  $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ . Déduisez-en

la valeur de  $S_n = \sum_{k=0}^n (k^3 + k^2 + k + 1) \binom{n}{k}$ .

**Exercice 17.** Soient  $m$  et  $n$  deux entiers. On note  $L(m, n)$  le nombre de chemins du plan  $\mathbb{R}^2$  joignant  $(0, 0)$  à  $(m, n)$  en se déplaçant vers l'est (translation de  $(+1, 0)$ ) ou vers le nord (translation de  $(0, +1)$ ).

- Montrez que  $L(m, n) = \binom{m+n}{n}$
- Déduisez-en l'identité de Pascal.
- Déduisez-en l'identité de Vandermonde.