

FEUILLE D'EXERCICES # 5

Exercice 1 *Sur les arbres de Galton-Watson*

Soit $P = \sum_{n \geq 0} p_n \delta_n$ une loi de probabilité sur \mathbb{N} et $(X_{n,k})_{n \geq 1, k \geq 1}$ une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi P . On définit par récurrence une suite $(Z_n)_{n \geq 0}$ telle que $Z_0 := 1$ et pour $n \geq 0$:

$$Z_{n+1} := \sum_{k=1}^{Z_n} X_{n+1,k}.$$

La suite Z_n représente le nombre d'individus à la génération n d'un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction P . On adopte ici la convention $\sum_{\emptyset} = 0$ de sorte que si $Z_n = 0$ alors $Z_{n+1} = 0$. On désigne par $T := \inf\{n \geq 0, Z_n = 0\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ le temps d'extinction de l'arbre.

1. Établir les points suivants :

- (a) Si $p_k = 1$ pour un $k \in \mathbb{N}$, i.e. $P = \delta_k$, alors $Z_{n+1} = kZ_n = \dots = k^{n+1}Z_0$.
- (b) Si $p_0 = 0$ et $p_1 < 1$ alors $\mathbb{P}(Z_n \nearrow \infty) = 1$. Autrement dit, la taille de l'arbre tend vers l'infini avec n (comparer au jeu de pile ou face).
- (c) Si $p_0 + p_1 = 1$ alors $\mathbb{P}(Z_n \searrow 0) = 1$. Autrement dit, l'arbre s'éteint presque sûrement et la loi du temps d'extinction T est géométrique.

Dans toute la suite, nous supposons que :

$$Z_0 = 1, \quad 0 < p_0 \leq p_0 + p_1 < 1, \quad p_k < 1 \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

On note $m := \mathbb{E}[Z_1]$ lorsque cette moyenne existe, et $\sigma^2 = \mathbb{E}[Z_1^2] - \mathbb{E}[Z_1]^2 \in \overline{\mathbb{R}}_+$.

2. Montrer que si $m < +\infty$, alors $\mathbb{E}(Z_n) = m^n$ pour tout $n \geq 0$ et si $\sigma^2 < \infty$ alors

$$\text{var}(Z_n) = m^n \sigma^2 \frac{m^n - 1}{m^2 - m}, \quad \text{prolongé en } n\sigma^2 \text{ si } m = 1.$$

Le cas $m = 1$ est dit critique, les cas $m < 1$ et $m > 1$ sont respectivement dits sous-critique et sur-critique.

- 3. Montrer que la probabilité d'extinction vérifie $\mathbb{P}(T < +\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(Z_n = 0)$.
- 4. Soit g la fonction génératrice de $X_{1,1} = Z_1$, i.e. $g(s) := \mathbb{E}[s^{Z_1}] = \sum_{m \geq 0} p^m s^m$, et soit g_n la fonction génératrice de Z_n , i.e. $g_n(s) = \mathbb{E}[s^{Z_n}]$. Montrer que l'on a la relation

$$g_n = \underbrace{g \circ g \circ \dots \circ g}_{n \text{ fois}}.$$

- 5. Remarquer que $\mathbb{P}(Z_n = 0) = g_n(0)$ et en déduire d'une part que, si $m \leq 1$ alors l'extinction est presque sûre i.e. $\mathbb{P}(T < +\infty) = 1$, et d'autre part que si $m > 1$ alors $\mathbb{P}(T < +\infty)$ est l'unique racine dans $]0, 1[$ de l'équation de point fixe $g(s) = s$. Expliciter cette probabilité lorsque la loi de reproduction est une loi géométrique $\mathcal{G}(p)$.
- 6. Montrer que la suite $Y_n := Z_n/m^n$ est une martingale. En déduire que le comportement asymptotique de Z_n lorsque n tend vers l'infini.

7. On cherche maintenant à préciser ce comportement asymptotique dans les cas critique et sur-critique. On suppose tout d'abord que $m = 1$ et $\sigma < +\infty$. En faisant un développement de Taylor de la fonction g à l'ordre 2 en zéro, montrer que
- (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\mathbb{P}(Z_n > 0) = 2/\sigma^2$;
 - (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[Z_n/n | Z_n > 0] = \sigma^2/2$;
 - (c) $\mathcal{L}(Z_n/n | Z_n > 0)$ tend lorsque n tend vers l'infini vers la loi exponentielle $\mathcal{E}(2/\sigma^2)$.
8. On suppose maintenant que $m > 1$ et $\sigma < +\infty$. Montrer que la martingale (Y_n) converge presque sûrement et dans \mathbb{L}^2 vers une variable positive Y_∞ qui vérifie :
- (a) $\mathbb{E}[Y_\infty] = 1$ et $\text{var}(Y_\infty) = \sigma^2/(m^2 - m)$;
 - (b) $\phi'_\infty(0) = -1$, et $\phi_\infty(ms) = g(\phi_\infty(s))$, où l'on a posé $\phi_\infty(s) := \mathbb{E}[e^{-sY_\infty}]$.

Exercice 2 *Modèle de Wright-Fisher*

Soient k et N deux entiers tels que $0 < k < N$. On définit par récurrence une suite de variables $(X_n^N)_{n \geq 0}$ de la façon suivante : $X_0^N := k$ et pour tout $n \geq 0$ et $i \in \{0, \dots, N\}$, la loi de X_{n+1}^N sachant que $X_n^N = i$ est la loi binomiale $\mathcal{B}(N, i/N)$.

1. Montrer que la suite $(X_n^N)_{n \geq 0}$ est une martingale.
2. Montrer que lorsque n tend vers l'infini, $(X_n^N)_{n \geq 0}$ converge presque sûrement et dans \mathbb{L}^p pour tout $p \geq 1$.
3. Décrire la loi de la variable limite X_∞^N .