



1 Indépendance d'événements

- Soient A, B, C trois événements d'un espace probabilisé de probabilité respective p, q, r . On suppose que c'est 3 événements sont indépendants.
 - Montrer que si A et B sont indépendants alors A et B^c sont aussi indépendants et que A^c et B^c sont aussi indépendants.
 - Exprimer la probabilité de l'événement $A \cup (B \cap C)$ à l'aide de p, q, r .
 - Exprimer la probabilité de l'événement $A \cap (B \cup C)$ à l'aide de p, q, r . En déduire que les événements A et $B \cap C$ sont indépendants.
- Dans les paquets de céréales Miel Pops, on trouve des figurines équitablement réparties parmi N personnages du dernier Walt Disney. Vous voulez la reine des neiges, combien devez-vous acheter de paquets de céréales pour que la probabilité d'avoir la reine des neiges soit supérieure à 0.8, 0.9? (Faire l'application numérique avec $N = 5$).
- En cas de migraine 3 patients sur 5 prennent de l'aspirine, 2 sur 5 prennent un médicament M présentant des effets secondaires. Avec l'aspirine, 75 % des patients sont soulagés. Avec le médicament M, 90 % des patients sont soulagés.
 - Quel est le taux global de personnes soulagés?
 - Quelle est la probabilité pour un patient d'avoir pris de l'aspirine sachant qu'il est soulagé?
- On a les statistiques suivantes sur les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Si cette personne n'a pas fumé le jour n alors la probabilité qu'elle ne fume pas le jour $n + 1$ est 0.9, mais si elle a fumé le jour n alors la probabilité qu'elle ne fume pas le jour suivant est 0.1. On note Q_n la proba de ne pas fumer le jour n .
 - Obtenir une formule pour Q_{n+1} dépendant de Q_n .
 - Trouver une formule pour Q_n ne dépendant que de n .
 - Quelle est la limite de Q_n ?
- On sait qu'à une date donnée, 3% d'une population est atteinte d'hépatite. On dispose de tests de dépistage de la maladie :
 - Si la personne est malade, alors le test est positif avec une probabilité de 95%.
 - Si la personne est saine, alors le test est positif avec une probabilité de 10%.
 - Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est positif?
 - Quelle est la probabilité pour une personne d'être saine si son test est positif?
 - Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est négatif?
 - Quelle est la probabilité pour une personne d'être saine si son test est négatif?
 - Est-ce que l'un des résultats vous semblent étrange?

2 Variables aléatoires

- Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{Z} - \{0\}$, dont la loi est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = n) = 2^{-|n|-1} \quad \forall n \in \mathbb{Z} - \{0\}.$$

- Vérifier que \mathbb{P} est bien une probabilité.
 - Quelle est la loi de la variable aléatoire $Y := X^2$?
 - Quelle est la loi de la variable aléatoire $Z := 2 + \pi \cos(\pi X)$?
- Quelle est la fonction de répartition d'une variable aléatoire
 - qui vaut π avec probabilité 1?

- (b) qui suit une Bernoulli ?
(c) qui suit une loi uniforme ?
(d) qui suit une loi exponentielle de paramètre 1 ?
(e) qui suit une loi de Poisson ?
8. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre 1. Calculez la fonction de répartition de $\max\{X, 1/X\}$, de $\min\{X, 1/X\}$.
9. (a) Soit $p \in [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1]$. Quelle est la loi de $\mathbf{1}_{[0,p]}(X)$?
(b) Soient a et b deux réels. Construisez, à partir de X , une variable aléatoire valant a avec probabilité p et b avec probabilité $1 - p$.
(c) On se donne cette fois-ci un triplet $(p, q, r) \in [0, 1]^3$ tel que $p + q + r = 1$, ainsi que trois réels a, b et c . Construisez, à partir de X , une variable aléatoire valant a avec probabilité p , valant b avec probabilité q , et valant c avec probabilité r .
10. Pour tout réel α , on définit une fonction p_α par $p_\alpha(x) := \alpha x^{\alpha-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ pour tout réel x .
(a) Pour quelles valeurs du paramètre α la fonction p_α est-elle une densité de probabilité ?
(b) Soit α un tel paramètre. Soit X une variable aléatoire dont la loi est de densité p_α . On pose $Y := -\alpha \ln(X)$. Calculez la densité de Y , et montrez qu'elle ne dépend pas de α . Quelle loi usuelle suit Y ?
11. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \geq 0$.
(a) Montrez que $\mathbb{E}(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.
(b) Calculez $\mathbb{E}\left(\frac{1}{1+X}\right)$.
12. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur $[-2, 2]$.
(a) Calculez la densité, la fonction de répartition, l'espérance et la variance de X .
(b) Faites de même avec X^2 .
13. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. On pose $Y := e^X$.
(a) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculez le moment d'ordre k de Y .
(b) Calculez la densité de Y .
14. Soit X une variable aléatoire dont la loi admet une densité f sur \mathbb{R} . On suppose que f est symétrique par rapport à un certain réel m , c'est-à-dire que $f(m+x) = f(m-x)$ pour tout réel x . On suppose de plus que $\mathbb{E}(|X|) < +\infty$. Montrez que $\mathbb{E}(X) = m$.
15. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre $p \in (0, 1)$.
(a) Retrouvez par un calcul direct la valeur de $\mathbb{E}(X)$.
(b) Pour quels réels s la valeur $\mathbb{E}(s^X)$ est-elle bien définie ?
(c) Calculez $f(s) := \mathbb{E}(s^X)$ pour ces valeurs de s .
(d) Que vaut $f'(0)$?
16. La durée de vie d'un composant électronique, notée T , est une variable aléatoire. On suppose qu'elle suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, c'est-à-dire qu'elle est de densité $\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0, +\infty)}(x)$.
(a) On sait que 1% des composants ont une durée de vie inférieure à 120 heures et 36 minutes. Déterminez la durée de vie moyenne, en heures, d'un composant.
(b) Trouvez le réel t tel que 80% des composants ont une durée de vie supérieure à t .