

Feuille n° 3 : Dérivabilité

1 Dérivabilité

Exercice 1

En utilisant simplement la définition de la dérivée comme limite, montrer l'existence et calculer la dérivée des fonctions suivantes :

$$(a) x \mapsto x^2 + x, \quad (b) x \mapsto \sqrt{x+1}, \quad (c) x \mapsto \frac{1}{x+2}.$$

Exercice 2

Pour chacune des fonctions suivantes :

$$(a) x \mapsto \cos(x \ln(x)), \quad (b) x \mapsto \sqrt{x^2 + e^x},$$

$$(c) x \mapsto \ln(\ln(x)), \quad (d) x \mapsto \frac{\cos(x)}{1 + 2 \sin(x)}.$$

1. Déterminer les domaines de définition et de dérivabilité de la fonction,
2. Utiliser les résultats concernant la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient et d'une composée pour calculer la dérivée en tout point du domaine de dérivabilité.

2 Dérivée de fonctions composées

Exercice 3

1. La fonction $\mathbb{R} \setminus \{0\} \ni x \mapsto \ln|x| \in \mathbb{R}$ est-elle dérivable sur son domaine de définition ?
2. On considère l'expression

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|.$$

Montrer qu'elle permet de définir une application f (dont on précisera le domaine de départ et le domaine d'arrivée).

3. Montrer que f est dérivable et calculer sa dérivée.

3 Inégalités et extrémums

Exercice 4

Pour chacune des fonctions suivantes, et leurs domaines de définition respectifs, déterminer les minima, maxima locaux et globaux quand ils existent.

$$(a) (x^2 - 1)^2, \quad (b) x^2 + 2x - 3, \quad -2 \leq x \leq 2.$$

Exercice 5

Soit $f(x) = |x^2 - 4|$.

- a) Déterminer les points critiques de f .

b) Déterminer les minima, maxima locaux et globaux de f .

Exercice 6

Montrer que $\forall x \geq 0, \ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$.

Exercice 7

Montrer les inégalités suivantes :

1. Pour tout $x \geq 0$, on a $(1+x)^{\frac{1}{3}} \leq 1 + \frac{1}{3}x$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|\sin x| \leq |x|$.
3. Pour tout $x \geq 0$, on a $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.

4 Variations de fonctions

Exercice 8

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 - 1}.$$

1. Déterminer le domaine de définition de f et sa parité.
2. Montrer que $f'(x)$ a le même signe que $x^4 - 4x^2 - 1$.
3. En déduire les variations de f .
4. Déterminer les asymptotes du graphe de f .
5. Tracer le graphe de f .

Exercice 9

On considère la fonction f suivante

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x.$$

1. Déterminer le domaine de définition \mathcal{D} de f et sa parité éventuelle.
2. Montrer que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathcal{D}$.
3. Montrer que $f'(x)$ et $f(x)$ sont de signes opposés pour tout $x \in \mathcal{D}$.
4. En déduire les variations de f .
5. Montrer que, pour tous réels positifs a et b (dont la somme est strictement positive),

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

6. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
7. Déterminer les asymptotes du graphe de f .
8. Tracer le graphe de f .

Exercice 10

Etudier les variations et tracer le graphe des fonctions suivantes.

$$(f_0(x) = \ln(1+x^4), \quad f_1(x) = \frac{x}{\ln(x)}, \quad (b) \quad f_2(x) = x - 2 \ln(3e^x + 3),$$

Exercice 11

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x + 3\text{Arctan}x - \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

1. Déterminer le signe de $\frac{x-1}{x+1}$ selon les valeurs de x .
2. En déduire le domaine de définition \mathcal{D}_f de f .
3. Vérifier que f est impaire.
4. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ on a

$$f'(x) = \frac{x^4 + x^2 - 6}{x^4 - 1}.$$

5. En déduire que le signe de $f'(x)$ est celui de $x^4 + x^2 - 6$.
6. Etudier les variations de f .

5 Fonctions réciproques

Exercice 12

On pose $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall x \in D, \quad f(x) = \frac{2x}{3x - 1}.$$

1. Déterminer $f(D)$.
2. La fonction f est-elle injective ?
3. On considère $g : D \ni x \mapsto f(x) \in f(D)$. Expliquer pourquoi g est bijective et expliciter sa réciproque.
4. Esquisser les graphes de g et g^{-1} sur un même dessin.

Exercice 13

On pose $I =]-3, +\infty[$ et on considère $I \ni x \mapsto f(x) = 5 - 12x - 2x^2 \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que f est strictement décroissante et réalise une bijection sur son image (bijection qu'on appellera encore f). Donner la bijection réciproque.
2. Esquisser le graphe de f et le graphe de son inverse sur un même dessin.

Exercice 14

Etudier les variations et tracer le graphe des fonctions suivantes.

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right), \quad g(x) = \operatorname{Arctan}x + \operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right), \quad h(x) = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 15

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2 + 3}}.$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .
2. Trouver un sous-domaine $D \subset D_f$ tel que f soit une bijection de D sur $f(D)$.
3. Utiliser un théorème du cours pour montrer, sans calculs, que f admet une fonction réciproque définie sur un domaine de définition à déterminer. Quelle est l'image de f^{-1} ?
4. Tracer f et sa réciproque f^{-1} dans un même repère.
5. Trouver par le calcul l'expression de f^{-1} . Retrouver les résultats précédents.

Exercice 16

Simplifier les expressions suivantes.

$$(a) \quad \cos(\arcsin(x)), \quad \sin(\arcsin(x)), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(b) \quad \arcsin(\sin(x)), \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad (c) \quad \arcsin(\sin(x)), \quad x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

6 Fonctions trigonométriques réciproques

Exercice 17

Trouver des exemples numériques pour montrer qu'en général

$$\arctan(x) \neq \frac{\arcsin(x)}{\arccos(x)}.$$

Exercice 18

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\sin(\arcsin(x))$, pour $x \in \mathbb{R}$,
2. $\arcsin(\sin(x))$, pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$,
3. $\arcsin(\sin(x))$, pour $x \in [\pi, 3\pi]$,
4. $\arcsin(\sin(x))$, pour $x \in [3\frac{\pi}{2}, 5\frac{\pi}{2}]$,
5. $\cos(\arcsin(x))$,
6. $\sin(\arctan(x))$.

Exercice 19

Donner le domaine où les fonctions suivantes sont définies et dérivables et déterminer la dérivée sur ce domaine :

$$(a) f_1(x) = \frac{x}{\ln(x)} + \arcsin(x^2); \quad (b) \arctan\left(\frac{x+1}{x}\right); \quad (c) \arccos(2x^2 - 1).$$

7 Fonctions trigonométriques hyperboliques

Exercice 20

On considère les fonctions définies sur \mathbb{R} et à valeurs dans \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

1.
 - a. Établir que, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,
$$\text{ch}(a+b) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) + \text{sh}(a)\text{sh}(b).$$
 - b. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$.
2.
 - a. Montrer que $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une bijection et donner l'expression explicite de sa bijection réciproque, notée argsh .
 - b. Calculer la dérivée de argsh .
 - c. La fonction $\text{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle surjective, injective?
 - d. On considère maintenant $\text{ch} : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[$. Montrer que la fonction est bien définie et qu'il s'agit d'une bijection dont on calculera la réciproque, notée argch .
 - e. Calculer la dérivée de argch .

8 Fonctions de plusieurs variables

Exercice 21

Déterminer les domaines de dérivabilité des applications suivantes, puis calculer leurs dérivées partielles.

1. L'application $h : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $h(x, y) = x^2 + y^2$.
2. L'application f de $\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f(x, y, z) = xy^2z$.
3. L'application g de $\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $g(u, v) = uve^v$.
4. L'application $k : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie par $k(x, y) = \sin(xy^2)$.
5. L'application $l : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ définies par $l(u, v, w) = uvw$.

Exercice 22

Déterminer puis représenter graphiquement le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f_1(x, y) = \cos(x + 2y + 1)$
2. $f_2(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$
3. $f_3(x, y) = |xy|$
4. $f_4(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} + \ln(4 - x^2 - y^2 - z^2)$

Déterminer les domaines de dérivabilité des dérivés partielles, puis les calculer.

9 Pour aller plus loin

Exercice 23

Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ pour que la fonction définie sur \mathbb{R}_+ par

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

soit dérivable sur \mathbb{R}_+^* .

Exercice 24

Calculer les limites suivantes au besoin à l'aide de la règle de l'Hôpital :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{\tan(x)} \right), \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1 - x}}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right).$$

Exercice 25

Utiliser la définition des dérivées pour calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x - 1}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right).$$

Exercice 26

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et soit $n \in \mathbb{N}$. A l'aide du théorème de Rolle, montrer que le polynôme

$$P(X) = X^n + aX + b$$

admet au plus trois racines réelles distinctes.