



**Pour le premier TD : vérifiez que vous savez faire tous les exos de révision, et posez vos questions en TD si besoin.**

### 1. RÉVISIONS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

On rappelle qu'un plan euclidien muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  s'identifie à l'ensemble des nombres complexes : le point  $M$  de coordonnées  $(a, b)$  est associé au nombre complexe  $z = a + ib$ . On dit alors que  $M$  est le point *d'affixe*  $z$ . On rappelle qu'un nombre complexe  $z = a + ib$  a une écriture polaire  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$  où  $r$  est le module  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  de  $z$  et  $\theta$  un *argument* de  $z$ , c'est-à-dire une mesure dans  $\mathbb{R}$  modulo  $2\pi$  de l'angle de vecteurs  $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$  où  $M$  est le point d'affixe  $z$ .

#### Exercice 1 🏠 (Représentation graphique)

Représenter graphiquement les ensembles) ci-dessous.

1.  $A = \{z \in \mathbb{C}, |z + 2| \geq 3\}$
2.  $B = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) \geq -1\}$
3.  $C = \{z \in \mathbb{C}, |z - 2i| \leq 1 \text{ et } \operatorname{Im}(z) \geq 5/2\}$
4.  $D = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Arg}(z) \in [-\pi/4, \pi/4] \text{ ou } \operatorname{Re}(z) \leq -1\}$ .

#### Exercice 2 🏠 (Transformations du plan)

Exprimer les transformations géométriques suivantes comme des fonctions de la variable complexe.

1. La réflexion par rapport à la droite d'équation  $y = 0$ .
2. La réflexion par rapport à la droite d'équation  $y = 1$ .
3. la réflexion par rapport à la droite d'équation  $x = 0$ .
4. La symétrie centrale de centre le point  $O$  d'affixe 0.
5. La symétrie centrale de centre le point  $C$  d'affixe  $z_0 = 1 + i$ .
6. l'homothétie de centre  $C$  et de rapport 3.
7. la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\pi/2$ .
8. la rotation de centre  $C$  et d'angle  $\pi/3$ .
9. la translation de vecteur  $(1, -1)$ .

#### Exercice 3 🏠 (Racines)

1. Déterminer les racines carrées et les racines cubiques de  $i$ .
2. Déterminer les racines cubiques de 1.
3. Déterminer les racines carrées de  $\sqrt{3} + 3i$ .
4. Résoudre les équations  $z^2 + 2z - 2 + 4i = 0$  et  $z^6 - z^3 + 1 = 0$ .

**Exercice 4**

Soit  $f$  une fonction définie sur un voisinage de  $z$ . Montrer que  $f$  est  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z$  si et seulement s'il existe  $a \in \mathbb{C}$  tel que :

$$f(z+h) = f(z) + ah + o(h)$$

lorsque  $h \rightarrow 0$ .

**Exercice 5** (Multiplication et composition d'applications  $\mathbb{C}$ -dérivable)

1. Soient  $f, g$  deux fonctions définies au voisinage de  $z$  et  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z$ . Montrer que  $fg$  est  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z$  et que  $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$ .
2. Soit  $f$  une fonction définie au voisinage de  $z$ ,  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z$  et  $g$  une fonction définie au voisinage de  $f(z)$  et  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $f(z)$ . Montrer que  $g \circ f$  est  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z$  et que  $(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$ .

**Exercice 6** ( $\mathbb{C}$ -dérivabilité en un seul point)

Trouver l'ensemble des points où la fonction :

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \begin{cases} z^3 & \text{si } z \neq 0 \\ \bar{z} & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

est  $\mathbb{C}$ -dérivable.

**Exercice 7** (Conjugaison, le retour)

Soit  $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $c \in \mathcal{U}$ , où  $\mathcal{U}$  est un ouvert.

1. Montrer que si  $f'(c) \neq 0$  alors la fonction  $z \mapsto \overline{f(z)}$  n'est pas dérivable en  $c$ .
2. Montrer que la fonction  $z \mapsto \overline{f(\bar{z})}$  est dérivable en  $\bar{c}$ . Calculer sa dérivée.

*Ind : On pourra simplement utiliser la définition de la  $\mathbb{C}$ -dérivabilité.*

**Exercice 8** ☆ (Facteur de Blaschke)

On note  $\mathbb{D}$  le disque unité. Soit  $|w| < 1$ . On définit la fonction  $F_w: \mathbb{C} \setminus \{\bar{w}^{-1}\} \rightarrow \mathbb{C}$  par :

$$z \mapsto \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$$

1. Rappeler pourquoi  $F_w$  est une fonction holomorphe.
2. Montrer que pour tout  $|z| < 1$ , on a  $|F_w(z)| < 1$ .

*Ind : On pourra montrer que :*

$$1 - |F_w(z)|^2 = \frac{(1 - |w|^2)(1 - |z|^2)}{1 + |w|^2|z|^2 - 2\operatorname{Re}(w\bar{z})}$$

3. Montrer que si  $|z| = 1$  alors  $|F_w(z)| = 1$ .
4. Conclure que l'application  $F_w$  vérifie les propriétés suivantes :
  - a.  $F_w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , autrement dit  $F_w: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  est bien définie et holomorphe.
  - b.  $F_w$  échange 0 et  $w$ , autrement dit  $F_w(0) = w$  et  $F_w(w) = 0$ .
  - c.  $F_w(\partial\mathbb{D}) \subset \partial\mathbb{D}$ .
  - d. Les applications  $F_w: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $F_w: \partial\mathbb{D} \rightarrow \partial\mathbb{D}$  et  $F_w: \bar{\mathbb{D}} \rightarrow \bar{\mathbb{D}}$  sont des bijections continues, d'inverses continues (*Ind : Calculer  $F_w \circ F_w$* ).