
Feuille d'exercices n° 2
ESPACES DE SOBOLEV

Exercice 1. *Rappels de distribution.*

1. Soit $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R})$. On définit

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto \int_0^x g.$$

Montrer que $f' = g$ (au sens des distributions).

2. Soit $u \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$ une distribution telle que u' soit nulle. Montrer que u est constante.

3. Soit $u \in \mathcal{C}^0(\mathbf{R})$ tel que $g_- := (u|_{\mathbf{R}_-^*})' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R}_-^*)$ et $g_+ := (u|_{\mathbf{R}_+^*})' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R}_+^*)$ avec g_- et g_+ intégrables au voisinage de 0.

Montrer que $u' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R})$ et que

$$u'(x) = \begin{cases} g_-(x) & \text{si } x < 0; \\ g_+(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Exercice 2. *Différences finies.*

Soit $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbf{R})$.

1. Montrer que si $1 \leq p \leq \infty$ et $u' \in L^p(\mathbf{R})$ alors $((u(\cdot + h) - u)/h)_{h>0}$ est bornée dans $L^p(\mathbf{R})$.
2. Montrer que si $1 < p \leq \infty$ et $((u(\cdot + h) - u)/h)_{h>0}$ est bornée dans $L^p(\mathbf{R})$ alors $u' \in L^p(\mathbf{R})$.
3. Donner un contre-exemple à l'implication précédente quand $p = 1$.

Exercice 3. *Exponentielles oscillantes.*

Pour $\varepsilon > 0$, on définit

$$u_\varepsilon :]0, 1[\rightarrow \mathbf{C}, \quad x \mapsto e^{i \frac{x}{\varepsilon}}.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbf{Z}$, il existe $0 < c_k \leq C_k$ tel que pour tout $1 \leq p \leq \infty$, pour tout $0 < \varepsilon \leq 1$

$$\frac{c_k}{\varepsilon^k} \leq \|u_\varepsilon\|_{W^{k,p}(]0,1[)} \leq \frac{C_k}{\varepsilon^k}.$$

2. Déduire que l'injection de $L^\infty(]0, 1[; \mathbf{C})$ dans $L^1(]0, 1[; \mathbf{C})$ n'est pas compacte.

Exercice 4. *Un exemple d'échec d'injection.*

Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on définit $u_n :]0, 1[\rightarrow \mathbf{R}$ continue par les conditions suivantes

- u_n est constante égale à 1 sur $]0, \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)}]$;
- u_n est constante égale à 0 sur $[\frac{1}{2} + \frac{1}{(n+2)}, 1[$;
- u_n est affine sur $[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)}, \frac{1}{2} + \frac{1}{(n+2)}]$.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ est bornée dans $L^\infty(]0, 1[) \cap W^{1,1}(]0, 1[)$, mais bornée dans aucun $W^{\frac{1}{p}, p}(]0, 1[)$ quand $1 < p < \infty$.

Exercice 5. *Masse de Dirac.*

1. Expliquer pourquoi la masse de Dirac à l'origine δ_0 , vue comme une mesure sur \mathbf{R} , appartient à $W^{s,1}(\mathbf{R})$ pour tout $s < 0$.
2. Montrer que $\delta_0 \in W^{-1,\infty}(\mathbf{R})$.

Exercice 6. *Initiation au non linéaire.*

Soit $(k, p) \in \mathbf{N} \times [1, \infty]$ tel que $k - \frac{1}{p} \neq 0$. On admettra qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $\ell \in \llbracket 0, k \rrbracket$, pour tout $u \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$,

$$\|u^{(\ell)}\|_{L^{q_\ell}(\mathbf{R})} \leq C \|u^{(k)}\|_{L^p(\mathbf{R})}^{\frac{\ell}{k}} \|u\|_{L^\infty(\mathbf{R})}^{1 - \frac{\ell}{k}}$$

où q_ℓ est défini par

$$\frac{1}{q_\ell} := \frac{\ell}{k} \frac{1}{p}.$$

Montrer qu'il existe $C' > 0$ tel que, pour tout $u \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$ et $v \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$,

$$\|(u v)^{(k)}\|_{L^p(\mathbf{R})} \leq C' \left(\|u^{(k)}\|_{L^p(\mathbf{R})} \|v\|_{L^\infty(\mathbf{R})} + \|u\|_{L^\infty(\mathbf{R})} \|v^{(k)}\|_{L^p(\mathbf{R})} \right).$$