

## TP 1

### Utilisation de Sage pour le calcul formel

A la fin du TP, il faudra rendre votre copie :  
enregistrez une dernière fois votre feuille de travail dans un fichier  
nommé

TP1\_votrenom\_votreprenom.sagews

et déposez ce fichier dans le cours ALGB de votre ENT sous mes cours  
en ligne.

*Un seul dépôt possible au plus tard 15 min après la fin du TP.  
Vous ne pourrez pas déposer un deuxième fichier.*

Si vous n'avez pas terminé le TP pendant la séance, vous devez le finir  
en autonomie mais sans dépôt possible.

Rappel : pour sauvegarder et récupérer un fichier dans Sage, il faut

- (1) Cliquer sur le bouton vert "Save".
- (2) Cliquer sur Files (en haut à gauche).
- (3) Placez la souris sur le fichier correspondant à votre feuille de travail et cliquez sur "Download file".

#### 1. Utilisation des variables symboliques.

- (1) Construire l'expression symbolique  $P = (u^2 + 1)(u^2 - 2)$ .
- (2) Développer P.
- (3) Évaluer P en 2.
- (4) Définir et afficher l'expression symbolique  $\frac{x^2+2x+1}{x+1}$ .
- (5) Simplifier l'expression précédente.
- (6) Même question avec  $\sqrt{x^2}$ .

#### 2. Premières fonctions.

- (1) Écrire une procédure récursive `fact_rec` permettant de calculer  $n!$ .
- (2) Écrire une version itérative `fact_it`.
- (3) A l'aide de la commande `%timeit`, comparer les temps de calcul pour  $50!$  et  $500!$ . Comparer également avec la fonction `factorial` de `sage`.

### 3. Utilisation des listes.

- (1) Créer la liste  $L$  des entiers de 1 à 10.
- (2) Construire la fonction  $f : x \mapsto 2x + 1$ .
- (3) En utilisant la commande `map`, construire la liste  $K$  des 10 premiers entiers positifs impairs.
- (4) En utilisant une boucle `for`, calculer le produit scalaire de  $L$  et  $K$ .
- (5) Écrire une fonction `prodsca` qui calcule le produit scalaire de 2 listes. Cette fonction devra être commentée et traiter les cas pathologiques (listes de tailles différentes ou vides en entrée).
- (6) Construire la liste des nombres premiers inférieurs à 100:
  - (a) avec une boucle `for` et la commande `is_prime`,
  - (b) avec la commande `filter`,
  - (c) avec une boucle `while` et la commande `next_prime`.
- (7) En déduire le produit des nombres premiers inférieurs à 100.

### 4. Manipulation de polynômes.

- (1) Définir  $P = x^4 + 3x^2 + 2$  comme un polynôme symbolique et le factoriser.
- (2) Définir  $\mathbb{Q}[X]$  l'anneau des polynômes en la variable  $X$  définis sur  $\mathbb{Q}$ .
- (3) Définir  $P$  sur  $\mathbb{Q}[X]$  et le factoriser.
- (4) Définir  $P$  comme un polynôme à coefficients dans le corps fini  $\mathbb{F}_{43}(= \mathbb{Z}/43\mathbb{Z})$  et le factoriser.
- (5) Définir  $P$  comme un polynôme à coefficients dans le corps fini  $\mathbb{F}_{47}$  et le factoriser.
- (6) Définir  $P$  comme un polynôme à coefficients dans le corps fini  $\mathbb{F}_{41}$  et le factoriser.
- (7) Écrire une fonction qui place les coefficients d'un polynôme dans une liste.

- (8) Écrire une fonction qui calcule le polynôme dérivé d'un polynôme. La tester sur  $P$ .
- (9) Définir  $\mathbb{Z}[T]$  l'anneau des polynômes en la variable  $T$  définis sur  $\mathbb{Z}$ .
- (10) Calculer le pgcd de  $Q = T^3 - 31T - 30 \in \mathbb{Z}[T]$  et de sa dérivé. Que pouvez vous en dire sur la multiplicité des racines de  $Q$ .
- (11) "Envoyer"  $Q$  dans  $\mathbb{F}_{11}[T]$  et retester.

Exercice facultatif :

On s'intéresse à la suite de Syracuse, définie par

$$u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } n \text{ pair} \\ 3u_n + 1 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

- (1) Écrire une fonction qui, étant donné  $u_n$ , calcule  $u_{n+1}$ .
- (2) Construire une liste comprenant les 20 premiers termes de la suite pour  $u_0 = 17$
- (3) Il est conjecturé que quelque soit  $u_0 > 0$ , la suite  $u_n$  finit toujours par rentrer dans un cycle 1,4,2. Écrire une fonction qui vérifie l'exactitude de cette conjecture et qui retourne le plus petit indice pour lequel la suite vaut 1.
- (4) Sachant que la commande `ZZ.random_element(1000)` fournit un entier (ZZ) aléatoire entre 0 et 999, calculer l'indice moyen pour lequel la conjecture est vérifiée pour 100 valeurs de  $u_0$  tirées aléatoirement entre 1 et 1000.