

Vendredi 25 septembre 2009

Homographies

Exercice 1 On appelle *homographie* une application du plan complexe dans lui-même de la forme $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, où a, b, c, d sont quatre complexes tels que $ad - bc \neq 0$.

(1) Indiquez l'ensemble de définition et l'image d'une homographie.

On appelle *droite projective complexe* et on note $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la réunion de \mathbb{C} et d'un point, appelé *point à l'infini* et noté ∞ . On a donc $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

(2) Montrez qu'une homographie se prolonge d'une manière naturelle, utilisant les règles de calcul sur les limites, en une bijection de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.

(3) Montrez que l'ensemble \mathcal{H} des homographies possède une structure naturelle de groupe (pour quelle loi ?) et que ce groupe est engendré par les similitudes directes et par l'application $z \mapsto 1/z$.

(4) À la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ on associe l'homographie $h_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Montrez que ceci définit un morphisme de groupes $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{H}$. Déterminez son image et son noyau.

Exercice 2 (1) Quel est le nombre de points fixes d'une homographie ?

(2) Quel est le groupe $\mathcal{H}_\infty \subset \mathcal{H}$ des homographies qui fixent ∞ ?

(3) Quel est le groupe $\mathcal{H}_{0,\infty} \subset \mathcal{H}$ des homographies qui fixent 0 et ∞ ?

(4) On considère l'homographie $h(z) = \frac{-1}{z+2}$. En utilisant les points fixes de h , construisez une homographie γ telle que $\gamma \circ h \circ \gamma^{-1}$ appartienne au sous-groupe \mathcal{H}_∞ . Peut-on faire en sorte que $h \in \mathcal{H}_{0,\infty}$?

(5) Mêmes questions avec l'homographie $h(z) = \frac{z+5}{z+1}$.

Exercice 3 Soit h une homographie, définie sur le complémentaire d'un point dans \mathbb{C} . On souhaite étudier les suites récurrentes à valeurs complexes définies par le choix d'un nombre complexe z_0 et la formule $z_{n+1} = h(z_n)$ pour tout $n \geq 0$. Il s'agit de voir pour quelles valeurs de z_0 cette suite est bien définie et converge ou diverge.

En choisissant judicieusement une homographie γ et en passant par la suite $y_n = \gamma(z_n)$, menez cette discussion pour les deux suites $z_{n+1} = \frac{-1}{z_n+2}$ et $z_{n+1} = \frac{z_n+5}{z_n+1}$.

Exercice 4 (Le birapport.)

(1) Soient a, b, c dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ distincts. Montrez qu'il existe une unique homographie h envoyant a, b, c sur $0, 1, \infty$. On supposera pour simplifier qu'aucun des points a, b, c n'est égal au point à l'infini.

Soient a, b, c, d quatre éléments de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ avec a, b, c distincts et h l'homographie de la question précédente. La valeur $h(d) \in \mathbb{C}$ est appelée le *birapport* de a, b, c, d et notée $[a, b, c, d]$.

(2) Soit $z \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. Calculez $[0, 1, \infty, z]$.

(3) Montrez que le birapport est invariant par homographie, c'est-à-dire que si f est une homographie, alors $[f(a), f(b), f(c), f(d)] = [a, b, c, d]$. (Considérez l'homographie hf^{-1} où h est l'homographie de la première question.)

(4) Donnez une formule pour le birapport $[a, b, c, d]$.

Exercice 5 (La droite projective complexe vue comme *sphère de Riemann*.) Dans l'espace euclidien $E = \mathbb{R}^3$, on considère la sphère unité S^2 et le plan équatorial \mathcal{P} . On appelle *projection stéréographique* notée $\sigma : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathcal{P}$ la projection depuis le pôle nord N , définie par $\sigma(M) = (NM) \cap \mathcal{P}$.

(1) Faites un dessin.

(2) On identifie E à $\mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$, de sorte que le plan équatorial s'identifie à \mathbb{C} . On note $(z, t) \in \mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$ les coordonnées d'un point $M \in E$. Donnez l'expression de σ dans ces coordonnées.

(3) On définit une application $\tau : \mathcal{P} \rightarrow S^2 \setminus \{N\}$ par $\tau(y) = \left(\frac{2y}{|y|^2+1}, \frac{|y|^2-1}{|y|^2+1}\right)$. Montrez que τ est une bijection réciproque de σ .

Si l'on pose $\sigma(N) = \infty$ et $\tau(\infty) = N$, on peut ainsi étendre σ en une bijection de la sphère S^2 dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. À cause de cela, la droite projective complexe est parfois appelée sphère de Riemann.

Exercice 6 (Cercles de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.) Dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la réunion d'une droite de \mathbb{C} et du point ∞ est appelée un *cercle de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ passant par ∞* . La famille des cercles de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ est donc constituée des cercles passant par ∞ , que l'on vient de définir, et des cercles ne passant pas par l'infini, qui sont les cercles ordinaires dans \mathbb{C} . Cette terminologie est justifiée par le fait que la projection stéréographique envoie les cercles tracés sur la sphère S^2 sur les cercles de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ au sens où l'on vient de les définir. Dans cet exercice, on souhaite démontrer que les homographies préservent la famille des cercles de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et en application, donner une condition de cocyclicité.

(1) On veut montrer que $h(\mathcal{C})$ est un cercle de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, pour tout cercle \mathcal{C} de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ et pour toute homographie h . Montrez qu'il suffit d'établir ce résultat pour $h(z) = 1/z$, ce que l'on supposera dans la suite.

(2) Montrez qu'on peut se ramener au cas où \mathcal{C} est symétrique par rapport à l'axe réel. (Poser $g(z) = e^{i\theta}z$ et calculer ghg .)

(3) Montrez que $h(\mathcal{C})$ est un cercle, en distinguant quatre cas :

$$\infty \notin \mathcal{C} \text{ et } 0 \in \mathcal{C} \quad ; \quad \infty \in \mathcal{C} \text{ et } 0 \notin \mathcal{C} \quad ; \quad \infty \notin \mathcal{C} \text{ et } 0 \notin \mathcal{C} \quad ; \quad \infty \in \mathcal{C} \text{ et } 0 \in \mathcal{C}.$$

(*Méfiez-vous car le centre de $h(\mathcal{C})$ n'est pas forcément l'image par h du centre de \mathcal{C} .*)

(4) Montrez que quatre nombres complexes a, b, c, d sont cocycliques ou alignés ssi leur birapport est réel.