

Partiel N. 1

Une attention particulière sera être portée à la rédaction. Tout devra être bien justifié.

[1] Soient X et Y deux v.a. de carré intégrable. On suppose que $\mathbb{E}(X^2|Y) = Y^2$ et $\mathbb{E}(X|Y) = Y$. Montrer que $X = Y$ p.s.

[2] On considère deux v.a. X, Y telles que $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(Y \geq k) = p^{k-1}$ pour tout $k \geq 1$ et

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{X \geq t\}}|Y) = e^{-Yt} \text{ pour } t \geq 0.$$

[a] Montrer que X est une v.a. continue et calculer sa densité de probabilité f_X .

[b] Calculer $\mathbb{P}(Y = k|X \geq t)$ pour $k \in \mathbb{N}$ et $t \geq 0$.

[3]

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Soit \mathcal{B} une sous-tribu de \mathcal{A} , X et Y deux v.a.r. telles que X soit \mathcal{B} -mesurable et que les tribus \mathcal{B} et $\sigma(Y)$ soient indépendantes. On suppose de plus que Y suit une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

[a] Démontrer l'équivalence des trois propriétés suivantes.

- $\exp(X^2/2)$ est \mathbb{P} -intégrable
- $\exp(XY)$ est \mathbb{P} -intégrable
- $\exp(|XY|)$ est \mathbb{P} -intégrable

[b] On suppose que $\exp(X^2/2)$ est \mathbb{P} -intégrable.

- Sans calculer l'espérance conditionnelle, démontrer que

$$\mathbb{E}(\exp(XY)|\mathcal{B}) \geq 1 \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

- Dans le cas où $\mathcal{B} = \sigma(X)$, calculer $\mathbb{E}(\exp(XY)|\mathcal{B})$.
- Dans le cas où $\sigma(X) \subsetneq \mathcal{B}$, calculer $\mathbb{E}(\exp(XY)|\mathcal{B})$.

[c] On ne suppose plus que $\exp(X^2/2)$ est \mathbb{P} -intégrable. Calculer $\mathbb{E}(\exp(XY)|\mathcal{B})$.